

Склад

Концентрована біомаса живих клітин симбіозу пробіотичних мікроорганізмів, КУО / г, не менше:

- лактобацили і лактококи - $6,0 \times 10^{10}$,
- пропіоновокислі бактерії - $3,0 \times 10^{10}$,
- біфідобактерії - $1,0 \times 10^{10}$,
- оцтовокислих бактерій, КУО / г, не менше - $1,0 \times 10^6$.

Загальні властивості

Препарат нормалізує мікрофлору кишечника, має антидіарейні властивості і імуномодуючу дію.

Властивості препарату обумовлені спільною дією живих клітин багатоштамової симбіотичної культури.

Біфідобактерії (Bifidobacterium) - облігатно-анаеробні, грампозитивні, аспорогенні, сахаролітичні представники фізіологічної індигенної мікрофлори здорової людини. Активно ферментують вуглеводи з утворенням оцтової та молочної кислоти, синтезують вітаміни і полісахариди, стимулюють імунітет, пригнічують розвиток патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, сприяють поліпшенню травної функції.

Лактобацили (Lactobacillus) - активно пригнічують розвиток шкідливої мікрофлори за рахунок синтезу молочної кислоти, перекису водню, лізоциму, антибіотиків, лактоцинів, підвищують захисні сили організму.

Лактококи (Lactococcus) - ферментують вуглеводи з утворенням L + молочної кислоти, синтезують полісахариди.

Пропіоновокислі бактерії (Propionibacterium) - аспорогенні, сахаролітичні анаероби, синтезують пропіонову і оцтову кислоти, кобаламін, пригнічують розвиток широкого спектра патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, в т. ч. грибів, активно стимулюють біфідобактерії, лактобацили і лактококи і їх пробіотичну активність.

Оцтовокислі бактерії (Acetobacter) - апатогенні, облігатно аеробні, грамнегативні, безспорові палички. Активні стимулятори росту і фізіолого-біохімічних властивостей пробіотичних сахаролітичних анаеробів роду Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus і Propionibacterium.

При введенні препарату regos активна пробіотична мікрофлора за рахунок активного зростання і синтезу органічних кислот і бактеріоцинів пригнічує життєдіяльність патогенної і умовно-патогенної мікрофлори по всьому шлунково-кишковому тракту, починаючи з ротової порожнини і закінчуючи дистальними відділами кишечника, стимулює діяльність імунної системи, відновлює склад індигенної нормофлори, нормалізує травну функцію, руйнує молекули токсинів і алергенів.

Рекомендації по вживанню

Рекомендується вживати з метою загального зміцнення організму, поліпшення травлення, підтримки на нормальному рівні кишкової мікрофлори та її відновлення при дисбіотичних станах, а також для нормалізації мікрофлори кишечника під час і після прийому антибіотиків.

Спосіб застосування

Вживати дорослим і дітям старше 3-х років і старше по 1 пакетик або флакону 1-2 рази на добу (вранці або вранці і ввечері) під час або після їди. Курс споживання - 3-4 тижні, в подальшому курс споживання необхідно узгоджувати з лікарем. Перед застосуванням рекомендується консультація з лікарем.

Перед вживанням пакетик розрізати по позначці, а з флакона зняти металевий ковпачок і гумову пробку. Вміст пакетика або флакона розвести в 15-30 мл (1-2 столові ложки) кип'яченого молока або питної води кімнатної температури, ретельно перемішати і використовувати відразу після розведення. Вміст пакетика або флакона призначений для одноразового використання.

Особливості застосування

Для максимальної ефективності інтервал між прийомом добавки дієтичної і антибіотиків повинен складати 3 години.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів.

Не є лікарським засобом.

Форма випуску

Скляні флакони або пакетики з полімерної плівки, герметично упаковані.

Маса нетто: $(10 \pm 0,5)$ г

Без ГМО.

Термін придатності

2 місяці з дати виробництва.

Дата виробництва та номер партії: дивись на упаковці

Умови зберігання

Зберігати при температурі (4 ± 2) ° С в недоступному для дітей місці.