

Склад

1 ml (мл) розчину містить: активний інгредієнт: лактаза – 4500 FCC ALU; допоміжна речовина: гліцерин (загущувач). Без ГМО. Без глютену.

Показання до використання

Рекомендовано як дієтична добавка до раціону харчування при коліках, зумовлених лактазною недостатністю. Несприйнятливість до молока, або лактазна недостатність, – це стан організму, коли лактаза виробляється в недостатній кількості для розщеплення лактози у складі молока. КУЧИКУ® Коліки краплі є джерелом ферменту лактази, необхідного для перетравлення молока.

Полегшує розщеплення та перетравлення лактози, що міститься у складі молока, за рахунок дії ферменту лактази. Сприяє зменшенню болю в животі та усуненню колік у немовлят. КУЧИКУ® Коліки краплі можна використовувати від народження. Для перорального застосування разом з молоком матері або з дитячою харчовою сумішшю.

Спосіб застосування та дози

Рекомендовано вживати дітям грудного віку (від народження до одного року) та раннього віку (від одного до трьох років):

- при грудному вигодовуванні (із розрахунку на одне годування): накапайте у ложку 4-5 крапель, додайте кілька крапель грудного молока та дайте отриману суміш дитині під час, до або після годування груддю;
- при годуванні адаптованими сумішами (дитяче харчування із розрахунку на одне годування): додайте 4-5 крапель у тепле (температура від 30 до 40 °C) готове до вживання харчування, що містить лактозу або молоко та ретельно перемішайте.

Флакона КУЧИКУ® Коліки краплі вистачає приблизно на 75 годувань.

Використовувати при кожному годуванні впродовж перших 3-4 місяців життя.

Якщо коліки не минають, проконсультуйтеся з лікарем.

Особливості застосування

Не слід капати КУЧИКУ® Коліки краплі безпосередньо в ротову порожнину дитині. Не слід додавати краплі у гаряче або дуже холодне молоко або молочну

суміш, не слід розігрівати суміш разом з краплями. Перед початком прийому рекомендована консультація лікаря.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не слід використовувати КУЧИКУ® Коліки краплі при вигодовуванні дитини безлактозною сумішшю.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окремих компонентів.

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка КУЧИКУ® Коліки краплі / KUCHIKOO® Colic Drops.

Форма випуску

Краплі для перорального застосування в полімерному флаконі-крапельниці з контролем першого відкриття, в картонній упаковці.

Об'єм: 15 ($\pm$ 0,4) ml (мл).

Умови зберігання

Зберігати в сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці, подалі від прямих сонячних променів при температурі не вище 25 °C. Не заморожувати.

Після відкриття флакон зберігати в холодильнику при температурі 4 ($\pm$ 2) °C та використати протягом 20 днів.