

Опис

Функціональне дитяче харчування: ентеральне харчування **Нутрізон Паудер / Nutrison Powder** призначено для дорослих пацієнтів і дітей від 1 року зі звичайними потребами у білку та енергії. Суха, повноцінна, збалансована суміш, що застосовується як ентеральне харчування для введення до шлунково-кишкового тракту за допомогою зонда чи для перорального прийому.

- Повноцінна, збалансована суміш, збагачена натуральними каротиноїдами.
- Має насичений мінеральний та вітамінний склад.
- Відсутність харчових волокон дозволяє використовувати Нутрізон Паудер у випадках, коли не показано стимуляції моторно-евакуаторної функції кишківника.
- Не містить клінічно значущих лактози, глютену, холестерину.
- Не містить генетично модифікованих компонентів.

Склад

Глюкозний сироп, казеїнат (з коров'ячого **молока**), рослинні олії (пальмова олія, кокосова олія, рапсова олія, соняшникова олія, олія із середньоланцюговими тригліцеридами (пальмова олія)), цитрат калію, емульгатор (**соєвий** лецитин), цитрат натрію, хлорид натрію, гідроортофосфат калію, магнію хлорид, хлорид холіну, карбонат кальцію, гідроортофосфат магнію, фосфат кальцію, L-аскорбат натрію, мальтодекстрин, ароматизатор (Ваніль), сульфат заліза (II), L-аскорбінова кислота, сульфат цинку, нікотинамід, ацетат DL-альфа-токоферолу, сульфат міді (II), сульфат марганцю (II), D-пантотенат кальцію, гідрохлорид тіаміну, фторид натрію, DL-альфа-токоферол, гідрохлорид піридоксину, ретинілпальмітат, рибофлавін, сахароза, фолієва кислота, холекальциферол, хлорид хрому (III), молібдат натрію, каротиноїди (містить сою) (β-каротин, лютеїн, живиця лікопену з томатів), йодид калію, селеніт натрію, D-біотин, фітоменадіон, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.

Поживна цінність		на 100 г	на 100 мл
Енергетична цінність	кДж/ккал	1943/463	420/100
Жири, з них:	г	18,2	3,9

насичені	г	8,5	1,8
Вуглеводи, з них:	г	56,6	12,2
цукри	г	8,7	1,9
- лактоза	г	<0,14	<0,030
Харчові волокна	г	0	0
Білки	г	18,2	3,9
Сіль	г	1,2	0,26
Вітаміни			
Вітамін А	мкг	381	82,4
Вітамін D	мкг	6,01	1,30
Вітамін E	мг (α-TE)	5,94	1,28
Вітамін K	мкг	24,4	5,28
Тіамін	мг	0,69	0,15
Рибофлавін	мг	0,74	0,16
Ніацин	мг NE/мг	8,30/4,26	1,79/0,92
Пантотенова кислота	мг	2,45	0,53

Вітамін В ₆	мг	0,79	0,17
Фолієва кислота	мкг	123	26,6
Вітамін В ₁₂	мкг	1,02	0,22
Біотин	мкг	19,7	4,27
Вітамін С	мг	59,5	12,9
Мінеральні речовини			
Натрій	мг	472	102
Калій	мг	706	153
Хлориди	мг	578	125
Кальцій	мг	370	80,1
Фосфор	мг	290	62,8
Магній	мг	69,3	15,0
Залізо	мг	7,38	1,59
Цинк	мг	5,54	1,2
Мідь	мг	0,83	0,18
Марганець	мг	0,93	0,20

Фториди	мг	0,48	0,10
Молібден	мкг	48,6	10,5
Селен	мкг	26,4	5,70
Хром	мкг	25,7	5,56
Йод	мкг	63,1	13,6
Інші			
Каротиноїди	мг	0,74	0,16
Холін	мг	165	35,6
Осмолярність	мосмоль/л		320

Показання до використання

Може бути використане для зондового та перорального застосування як єдине або додаткове джерело харчування для дорослих та дітей від 1 року.

- Під час підготовки до операції та у післяопераційний період.
- У випадку інсульту, захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ): мукозитів, ентеритів різної етіології, зокрема спричинених променевою та хіміотерапією (холецистити, панкреатиту, фістул).
- За наявності часткових перешкод для проходження їжі: пухлин та травм голови і шиї, порушення ковтання і жування, стриктур та обструкції різних відділів шлунково-кишкового тракту.
- При станах, пов'язаних із втратою апетиту та/або відмовою від прийому їжі: онкологічних захворювань, неврологічних захворювань, психічних розладів, хвороб печінки, серцево-легеневої недостатності, ВІЛ-інфекції на стадії СНІДу.
- При недостатності харчування будь-якої етіології.

Властивості

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування Нутрізон Паудер призначено для дорослих пацієнтів і дітей від 1 року зі звичайними потребами у білку та енергії. Суха, повноцінна, збалансована суміш, що застосовується як ентеральне харчування для введення до шлунково-кишкового тракту за допомогою зонда чи для перорального прийому.

- Повноцінна, збалансована суміш, збагачена натуральними каротиноїдами.
- Має насичений мінеральний та вітамінний склад.
- Відсутність харчових волокон дозволяє використовувати Нутрізон Паудер у випадках, коли не показано стимуляції моторно-евакуаторної функції кишківника.
- Не містить клінічно значущих лактози, глютену, холестерину.
- Не містить генетично модифікованих компонентів.

Рекомендації щодо застосування

Може бути використане для зондового та перорального застосування як єдине або додаткове джерело харчування для дорослих та дітей від 1 року.

Під час підготовки до операції та у післяопераційний період. У випадку інсульту, захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ): мукозитів, ентеритів різної етіології, зокрема спричинених променевою та хіміотерапією (холецистити, панкреатиту, фістул).

За наявності часткових перешкод для проходження їжі: пухлин та травм голови і шиї, порушення ковтання і жування, стриктур та обструкції різних відділів шлунково-кишкового тракту.

При станах, пов'язаних із втратою апетиту та/або відмовою від прийому їжі: онкологічних захворювань, неврологічних захворювань, психічних розладів, хвороб печінки, серцево-легеневої недостатності, ВІЛ-інфекції на стадії СНІДу.

При недостатності харчування будь-якої етіології.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням ретельно вимити руки, використовуйте чистий або стерильний посуд, переконайтеся, що верхня частина пакування є чистою. Налити охолоджену кип'ячену воду в стерильний контейнер і додайте назначену лікарем кількість порошку. Використовуйте лише мірну ложечку, що входить до пакування. Ретельно перемішати до повного розчинення порошку. Не слід

додавати лікарські засоби до продукту. Застосовувати суміш кімнатної температури. Готуйте суміш на одну порцію годування. Готова суміш має час введення не довше 4 годин при кімнатній температурі. Завжди викидайте залишки суміші.

Застереження

Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

Забороняється використовувати води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Застосовувати тільки під наглядом лікаря!

Може бути використане як єдине джерело харчування.

Не використовувати для дітей віком до 1 року. З обережністю застосовувати для дітей віком від 1 до 6 років.

Можлива коагуляція у шлунково-кишковому тракті, наприклад, через взаємодію з лікарськими засобами. Необхідний ретельний моніторинг. Не є лікарським засобом.

Застереження

Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

Забороняється використовувати води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Застосовувати тільки під наглядом лікаря!

Може бути використане як єдине джерело харчування.

Не використовувати для дітей віком до 1 року. З обережністю застосовувати для дітей віком від 1 до 6 років.

Можлива коагуляція у шлунково-кишковому тракті, наприклад, через взаємодію з лікарськими засобами. Необхідний ретельний моніторинг. Не є лікарським засобом.

Застереження

Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

Забороняється використовувати води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!

Може бути використане як єдине джерело харчування.

Не використовувати для дітей віком до 1 року. З обережністю застосовувати для дітей віком від 1 до 6 років.

Можлива коагуляція у шлунково-кишковому тракті, наприклад, через взаємодію з лікарськими засобами. Необхідний ретельний моніторинг. Не є лікарським засобом.

Застереження

Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

Забороняється використовувати води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!

Може бути використане як єдине джерело харчування.

Не використовувати для дітей віком до 1 року. З обережністю застосовувати для дітей віком від 1 до 6 років.

Можлива коагуляція у шлунково-кишковому тракті, наприклад, через взаємодію з лікарськими засобами. Необхідний ретельний моніторинг. Не є лікарським засобом.

Протипоказання

Не використовувати для дітей віком до 1 року.

Не використовувати хворим на галактоземію.

У віці від 1 до 6 років застосовувати з урахуванням вікової потреби та переносимості (травна та видільна системи маленьких дітей можуть бути недостатньо зрілими, аби адекватно впоратися з підвищеною кількістю білка).

Забороняється вводити внутрішньовенно.

Умови зберігання

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%, не в холодильнику. Після першого відкриття щільно закрити банку, зберігати в прохолодному та сухому місці, не в холодильнику, спожити протягом 1 місяця.

Форма випуску

Порошкоподібна суміш у металевій банці, масою 430г. В кожній банці є мірна ложка на 4,3 г .

Виробник

Німеччина. Milupa GmbH. Fulda, Germany.