

Склад

діюча речовина: фурагін розчинний;

1 пакетик містить фурагіну розчинного 0,1 г;

допоміжна речовина: натрію хлорид.

Лікарська форма

Обполіскувач, порошок.

Основні фізико-хімічні властивості: крупний порошок оранжувато-коричневого кольору.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються у разі захворювань горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Фурагін розчинний має широкий спектр антибактеріальної дії проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, включаючи штами патогенних стафілококів та інших мікроорганізмів, резистентних до антибіотиків та інших хіміотерапевтичних засобів.

Порівняно з антибіотиками і сульфаніламидами резистентність до фурагіну розчинного розвивається повільно і незначною мірою.

Нітрофурани, в тому числі фурагін розчинний, пригнічують ферментну систему мікроорганізмів, а також сповільнюють інші біохімічні процеси в клітинах мікроорганізмів, що в свою чергу, призводить до руйнування клітинної оболонки або цитоплазматичної мембрани бактерій.

Нітрофурани поліпшують лейкопоез, посилюють здатність лейкоцитів до фагоцитозу, сприяють процесу грануляції. Фурагін розчинний ефективний при лікуванні всіх видів гнійних інфекцій (також зовнішніх). При обробці шкіри або слизової оболонки не чинить подразливої дії і не призводить до больових відчуттів.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Показання

Запалення ротової порожнини і глотки. Інфіковані рани, опіки та гнійні запалення.

Протипоказання

Підвищена чутливість (алергія) до фурагіну розчинного і препаратів нітрофуранового ряду.

Алергічний дерматит.

Не застосовувати для полоскання порожнини рота і горла дітям віком до 4-х років (оскільки дитина ще не вміє самостійно полоскати порожнину рота і горло).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

У поєднанні з антибіотиками проявляє виражений синергізм.

При вживанні алкоголю під час лікування Фурасолом зростає імовірність розвитку шкірних алергічних реакцій.

Особливості щодо застосування

Розчин застосовувати одразу після приготування.

При застосуванні розчину можливе забарвлення шкіри/ слизової оболонки у жовтий колір.

Зростає ймовірність розвитку алергічних реакцій шкіри в разі вживання алкоголю під час лікування.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не застосовувати. Немає даних контрольованих клінічних досліджень про застосування лікарського засобу під час вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням.

Запалення порожнини рота і горла

Вміст пакетика розчиняти в склянці (200 мл) гарячої води. Теплий розчин застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 2–3 рази на добу. Розчин не зберігати.

Інфіковані рани, опіки і гнійні запалення

Вміст пакетика розчиняють у склянці (200 мл) гарячої кип'яченої або дистильованої води. Теплий розчин застосовують для обробки інфікованих ран, опіків і гнійних запалень 1–2 рази на добу.

Діти

Не застосовувати для полоскання порожнини рота та горла дітям віком до 4 років, оскільки дитина ще не вміє самостійно полоскати порожнину рота і горло.

Передозування

Препарат малотоксичний. Випадки передозування не спостерігались.

Побічні ефекти

Зазвичай Фурасол переноситься добре. В окремих випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливі алергічні реакції (висип, свербіж).

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1 г препарату у пакетик з ламінату; по 5 або 15 пакетиків у пачці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Олайнфарм» / JSC «Olainfarm».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

вул. Рупніцу 5, Олайне, LV-2114, Латвія / 5 Rupnicu street, Olaine, LV-2114, Latvia.