

Склад

діюча речовина: глоду плоди (*Crataegi fructus*).

1 пачка містить глоду плодів (*Crataegi fructus*) 75 г;

1 пачка містить глоду плодів (*Crataegi fructus*) 100 г;

1 пачка містить глоду плодів (*Crataegi fructus*) 140 г;

1 фільтр-пакет містить глоду плодів (*Crataegi fructus*) 4,0 г.

Лікарська форма

Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості: цілі або подрібнені плоди від жовто-оранжевого і бурувато-червоного до темно-бурого або чорного кольору, іноді з білуватим нальотом.

Фармакотерапевтична група

Кардіологічні препарати. Код АТХ C01E B04.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини плодів чинять кардіотонічну, спазмолітичну, гіпотензивну, седативну та десенсибілізуючу дію; посилюють кровопостачання у коронарних судинах серця і в судинах мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів, посилюють скорочення серцевого м'яза та зменшують збудливість останнього, чинять заспокійливу дію, нормалізують артеріальний тиск,

сприяють зниженню рівня холестерину у крові.

Показання

Функціональні розлади серцевої діяльності, ангіоневрози, а також як доповнення до базисної антиаритмічної терапії легких форм миготливої аритмії та пароксизмальної тахікардії.

Протипоказання

Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних та антиаритмічних засобів, серцевих глікозидів.

Особливі заходи безпеки

Під час лікування препаратом необхідний контроль артеріального тиску. При тривалому застосуванні необхідна консультація лікаря.

Особливості щодо застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У період лікування препаратом слід утримуватись від керування транспортними засобами та виконання іншої роботи, що потребує підвищеної уваги, швидких психічних і рухових реакцій.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку подрібнених або 2 десертні ложки подрібнених плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за

30 хв до їди: дорослим – по $\frac{1}{3}$ склянки, дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки.

Перед прийомом відвар збовтати.

Приготовлений відвар зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

1 фільтр-пакет помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 100 мл.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 14 років за призначенням лікаря.

Передозування

При тривалому застосуванні у великих дозах можливі сонливість, зниження артеріального тиску, брадикардія. При появі ознак передозування слід припинити прийом препарату та провести симптоматичну та підтримуючу терапію (відповідно до клінічного стану хворого).

Побічні ефекти

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висип, свербіж, набряк шкіри); сонливість, зменшення частоти серцевих скорочень.

Термін придатності

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 75 г, або по 100 г, або по 140 г у пачках з внутрішнім пакетом;
по 4,0 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Адреса

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.