

Опис

Нутрізон Едванст Діазон / Nutrison Advanced Dison - харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування: рідка, готова до застосування, ізокалорійна суміш (100 ккал/мл) для дітей старше 3 років і дорослих з діабетом 2 типу, стресорною гіперглікемією чи ризиком її виникнення та тих, які мають звичайні потреби в білку та енергії.

- Має низький глікемічний індекс (17*).
- Містить 100% соєвий білок. Соєвий білок позитивно впливає на пацієнтів з порушеною толерантністю до глюкози, у випадку гіперглікемії чи діабету.
- Має знижений** вміст вуглеводів у вигляді фруктози (інсулінозалежне засвоєння) та крохмалю, який повільно розщеплюється і засвоюється, не викликаючи швидкого та різкого підвищення рівня глюкози у крові під час та після введення суміші.
- Високий вміст мононенасичених жирних кислот для запобігання атеросклерозу. **
- Високий вміст антиоксидантів (вітаміни С і Е, селен), які запобігають розвитку атеросклерозу.**
- Містить комбінацію з 6 розчинних і нерозчинних харчових волокон MF6. Харчові волокна знижують глікемічний індекс. Нерозчинні волокна нормалізують перистальтику кишечника (профілактика діареї), а розчинні волокна забезпечують пребіотичний ефект, оскільки є поживним середовищем для нормальної мікрофлори кишечника.
- Може містити сліди лактози, галактози, глютену, холестерину.
- Не містить генетично модифікованих компонентів.

** У порівнянні зі стандартними формулами для ентерального харчування.

***Відповідно до наукових досліджень та загальнодоступних рекомендацій для спеціалізованого харчування пацієнтів з обмеженою, ослабленою або порушеною здатністю приймати, перетравлювати, засвоювати звичайні харчові продукти або певні поживні речовини, що містяться в них, або їх метаболіти; цей перелік не є вичерпним.

1. International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) Report of the sub-committee on recommendations for intake of polyunsaturated fatty acids in healthy adults. June 2004.

2. Food and Agriculture Organization (FAO). Fats and fatty acids in human nutrition; report of an expert consultation. 10-14 November 2008; Geneva. FAO Food and Nutrition Paper; 91.

Склад

Вода, крохмаль, білок із **сої**, рослинні олії (соняшникова олія, рапсова олія), фруктоза, харчові волокна (інулін, олігофруктоза, гуміарабік, полісахариди з **сої**, целюлоза, резистентний крохмаль), емульгатор (**соєвий** лецитин), цитрат калію, хлорид натрію, регулятор кислотності (лимонна кислота), хлорид калію, карбонат магнію, фосфат кальцію, каротиноїди (містить **сою**) (β -каротин, лютеїн, живиця лікопену з томатів), хлорид холіну, гідроортофосфат калію, гідроксид кальцію, L-аскорбат натрію, гідроксид калію, ацетат DL-альфа токоферолу, лактат заліза (II), сульфат цинку, нікотинамід, ретинілацетат, хлорид хрому (III), глюконат міді, сульфат марганцю (II), D-пантотенат кальцію, ціанокобаламін, селеніт натрію, D-біотин, фолієва кислота, холекальциферол, гідрохлорид тіаміну, гідрохлорид піридоксину, рибофлавін, фторид натрію, йодид калію, молібдат натрію, фітоменадіон. Без ГМО. Без глютену.

Поживна цінність		на 100 ml (мл)
Енергетична цінність	kJ (кДж)/ kcal (ккал)	435/103
Жири, з них:	g (г)	4,2
Насичені	g (г)	0,5
Мононенасичені	g (г)	3,0
Поліненасичені	g (г)	0,7
Вуглеводи, з них:	g (г)	11,3
Цукри	g (г)	2,3
Лактоза	g (г)	<0,006
Харчові волокна	g (г)	1,5

Білки	g (г)	4,3
Сіль	g (г)	0,25
Вітаміни:		
Вітамін А	μg RE (мкг RE)	82
Вітамін D	μg (мкг)	0,70
Вітамін Е	mg α-TE (мг α-TE)	2,5
Вітамін К	μg (мкг)	5,3
Тіамін	mg (мг)	0,15
Рибофлавін	mg (мг)	0,16
Ніацин	mg NE / mg (мг)	1,8/0,89
Пантотенова кислота	mg (мг)	0,53
Вітамін В6	mg (мг)	0,17
Фолієва кислота	μg (мкг)	38
Вітамін В12	μg (мкг)	0,50
Біотин	μg (мкг)	4,0
Вітамін С	mg (мг)	15

Мінеральні речовини:		
Натрій	mg (мг)	100
Калій	mg (мг)	150
Хлориди	mg (мг)	125
Кальцій	mg (мг)	80
Фосфор	mg (мг)	72
Магній	mg (мг)	23
Залізо	mg (мг)	1,6
Цинк	mg (мг)	1,2
Мідь	mg (мг)	0,18
Марганець	mg (мг)	0,33
Фториди	mg (мг)	0,10
Молібден	μg (мкг)	10,0
Селен	μg (мкг)	7,5
Хром	μg (мкг)	12
Йод	μg (мкг)	13

Інше		
Каротиноїди	mg (мг)	0,2
Холін	mg (мг)	37
Осмолярність	mOsmol/l (мОсмоль/л)	300
Вода	ml (мл)	84

Показання до використання

- Нутрізон Едванст Діазон може бути використаний для зондового застосування як єдине чи додаткове джерело харчування у дорослих і дітей від 3 років з діабетом 2 типу, стресорною гіперглікемією чи ризиком її виникнення.
- Нутрізон Едванст Діазон, як єдине джерело харчування, показаний пацієнтам з діабетом 2 типу, стресорною гіперглікемією чи ризиком її виникнення з нормальною потребою в енергії та білку, яким необхідна дієта з низьким глікемічним індексом, багата на клітковину.
- Під час підготовки до операції та у післяопераційний період.
- За критичних станів: опіків, сепсису, множинної травми, інсульту.
- У випадку захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ): мукозитів, ентеритів різної етіології, зокрема спричинених променевою та хіміотерапією (холециститу, панкреатиту, фістул).
- За наявності часткових перешкод для проходження їжі: пухлин та травм голови і шиї, порушення ковтання і жування, стриктур та обструкції різних відділів шлунково-кишкового тракту.
- При станах, пов'язаних із втратою апетиту та/або відмовою від прийому їжі: онкологічних захворюваннях, неврологічних захворюваннях, психічних розладах, хворобах печінки, серцево-легеневій недостатності, ВІЛ-інфекції на стадії СНІДу.
- При недостатності харчування будь-якої етіології.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням перевірити зовнішній вигляд продукту, добре збовтати. Не слід розбавляти продукт та додавати лікарські засоби. Застосовувати суміш

кімнатної температури.

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування
Нутрізон Едванст Діазон / Nutrison Advanced Diason – суміш рідка, повноцінна, збалансована, готова до вживання, з харчовими волокнами, для годування через зонд. Для дієтичного харчування при мальнутриції (нутритивній недостатності) для пацієнтів з цукровим діабетом або гіперглікемією від 3 років і старше та дорослих. Продукт містить сліди лактози.

- Слід застосовувати під наглядом лікаря.
- Не слід застосовувати пацієнтам, які потребують дієти без вмісту харчових волокон.
- Продукт не призначено для парентерального харчування.
- Можна використовувати як єдине джерело харчування.

Застереження при застосуванні:

- Не слід розбавляти продукт та додавати лікарські засоби.
- Не використовувати для дітей віком до 3 років.
- З обережністю застосовувати для дітей віком 3-6 років.
- Не є лікарським засобом.

Перед застосуванням перевірити зовнішній вигляд продукту, добре збовтати. Не слід розбавляти продукт та додавати лікарські засоби. Застосовувати суміш кімнатної температури.

Протипоказання

- Не використовувати для дітей віком до 3 років.
- Не використовувати пацієнтам, які потребують дієти без вмісту харчових волокон.
- Не використовувати хворим на фруктоземію чи тих, які мають підвищену чутливість до окремих компонентів продукту.
- Забороняється вводити внутрішньовенно.

Рекомендований строк споживання: строк споживання узгоджується з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після відкриття закрити пляшку та зберігати в холодильнику і спожити протягом 24 годин.

Форма випуску

Рідка суміш у спадаючій пластиковій пляшці, об'ємом 500 мл.

Термін придатності

12 місяців

Виробник

Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ Зутермер /
"N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 NM Zoetermeer, The Netherlands

Імпортёр: ТОВ з іноземними інвестиціями "Нутриція Україна", Україна, 04080,
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2