

## Склад

1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт стебла і листя леспедези головчастої (*Lespedeza capitata*), порошкоподібний - 400 мг (mg), екстракт листя артишоку посівного (*Cynara scolymus*), порошкоподібний - 100 мг (mg); оболонка капсули: желатин.

## Опис

**Функціональні властивості** дієтичної добавки **Лібера Форте™** обумовлені фізіологічною активністю біологічно активних речовин, що входять до складу її активних інгредієнтів рослинного походження - екстракту стебла і листя леспедези головчастої (*Lespedeza capitata*) та екстракту листя артишоку посівного (*Cynara scolymus*).

**Екстракт стебла і листя леспедези головчастої** (*Lespedeza capitata*) містить флавоноїди, у т.ч. флавоноли – рутин; флавони, катехіни та інші біологічно активні речовини.

Комплекс біологічно активних речовин стебла і листя леспедези головчастої збільшує діурез, зменшує азотемію, підвищує виділення натрію і меншою мірою калію; сприяє збільшенню ниркової фільтрації, прискорює виведення азотистих шлаків із сечею.

**Екстракт листя артишоку посівного** (*Cynara scolymus*) містить цинарин, цинаропікрин, хлорогенову кислоту, аскорбінову кислоту, каротин, вітаміни групи В, інулін та проявляє жовчогінну, гепатопротекторну, сечогінну дії. Дослідження показують, що екстракт листя артишоку може мати також нефропротекторну та антиоксидантну дії, що може бути корисним для хворих із нирковою недостатністю. Згідно з протоколом надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю від 2004 року екстракт листя артишоку посівного використовується з метою зменшення рівня азотемії, токсичного уремичного навантаження нирок. Рандомізоване контрольоване дослідження показало, що споживання екстракту листя артишоку посівного може покращити ліпідний профіль у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю

## Рекомендації щодо застосування

За рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин (флавоноїдів, у т.ч. флавонолів – рутин; флавонолів, катехінів, а також цинарину та цинаропікрину), що сприятливо

впливають на функціональний стан нирок.

## **Не є лікарським засобом**

## **Спосіб застосування та дози**

Вживати дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу, дітям віком від 12 років та старше по 1 капсулі 1-2 рази на добу незалежно від прийому їжі; запивати невеликою кількістю питної води.

**Термін застосування** визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого ефекту, сприйнятливості дієтичної добавки та, зазвичай, становить 3 місяці. За необхідності курс застосування за рекомендацією лікаря повторюють.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

## **Особливості щодо застосування**

Регулярне щоденне споживання є особливо важливим для нормалізації функціонального стану нирок. Рекомендовано застосовувати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодоші та алкоголь.

## **Застереження**

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Рекомендовано контролювати рівень натрію в крові. Під час вагітності або у період лактації застосовувати тільки за призначенням лікаря.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

## **Виробник**

**Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:** ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд.3, оф.41

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Україна, 04208, м.Київ, просп. Правди, 80-В.