

Склад

Спиртовий екстракт прополісу-100 мг(mg), спиртовий розчин секрету бобра (кастореум)-200 мг(mg).

Допоміжні речовини: твердий жир, полісорбат - 80.

Показання до застосування

Супозиторії «ПРОВІТАДІН АКТИВ» застосовується в якості гігієнічно-профілактичного засобу, *ректально*- для підвищення лібідо та сексуальної активності; покращення потенції у чоловіків; для відновлення сексуальної функції після лікування простатиту; *вагінально* – для запобігання сухості піхви, відновлення слизових оболонок піхви та епітелію шийки матки; зниженню інтенсивності запальних процесів в жіночих статевих органах.

Побічна дія

Засіб зазвичай добре переноситься, в поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до продуктів бджільництва (в т.ч. прополісу) чи до інших компонентів засобу; дитячий вік, вагітність, годування груддю.

Спосіб застосування

Супозиторії застосовують ректально або вагінально. Перед застосуванням супозиторія необхідно:

- по лінії перфорації блістерної упаковки відірвати один супозиторій у первинній упаковці;
- далі необхідно потягнути за краї плівки, розриваючи її у різні боки, і звільнити супозиторій від первинної упаковки.

При ректальному застосуванні супозиторій вводять глибоко в пряму кишку після її випорожнення; при вагінальному застосуванні супозиторій вводять глибоко в піхву. Якщо супозиторій занадто м'який для введення, то його необхідно, не виймаючи з блістера, охолодити під струменем холодної води або у холодильнику протягом декількох хвилин.

Застосовують **по 1 супозиторію 1-2 рази на добу протягом 10 діб**. За необхідності застосування можна повторити. Виріб для одноразового використання.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25⁰С - 2 роки від дати виготовлення. Зберігати в недоступному для дітей місці.