

Склад

Туба 50 г містить:

основні речовини: папаїн, глюкозаміну гідрохлорид, гіалуронова кислота.

Фармакологічні властивості

Фармакологічні властивості крему зумовлені комплексною дією папаїну, глюкозаміну гідрохлориду, гіалуронової кислоти.

Крем для тіла **КАРІПАІН** зупиняє запальні процеси в хребті та суглобах, знімає біль, сприяє регенерації міжхребцевих дисків та хрящової тканини хребта і суглобів, покращує мікроциркуляцію в тканинах.

Папаїн – монотіолова цистеїнова ендопротеаза – природний фермент рослинного походження, отриманий з молочного соку папаї (*Carica Papaya*) Папаїн руйнує медіатори запалення, що знижує їх концентрацію в синовіальній рідині суглоба. Також папаїн стимулює продукцію організмом людини інгібіторів ендогенної протеїнази. Все це сповільнює процес деградації хрящової тканини без негативного системного впливу на організм

Глюкозамін відноситься до глікопротеїнів і бере активну участь в побудові хрящової тканини. Його основу складає хітин – природний полімер, отриманий з панцира ракоподібних. Комбінація папаїну з глюкозаміну гідрохлоридом стимулює продукцію глікозамингліканів і знижує ураження хряща.

Гіалуронова кислота – несольфатований глікозаміноглікан – полісахарид тваринного походження. Вона пригнічує хрящову дегенерацію і вивільнення протеогліканів з міжклітинного матриксу хрящової тканини, захищає поверхню суглобового хряща. Комбінація папаїну з гіалуронової кислотою покращує стан синовіальної рідини, знижує сприйняття болю. Гіалуронова кислота доставляється в уражений суглоб неінвазивно (з допомогою фонофорезу), в результаті чого суглоб додатково не травмується ін'єкцією і знижуються ризики ускладнень

Показання до використання

Як підтримуючий засіб застосовується при захворюваннях хребта в поєднанні з процедурами електрофорезу з Каріпаїн фл:

- міжхребетні грижі
- протрузії

- остеохондроз хребта
- дискогенний радикуліт

Як самостійний засіб застосовується при:

- Плече-лопатковий періартрит
- Артрити, артрози
- посттравматичні контрактури
- Неврит лицьового нерва

Спосіб застосування

Рекомендується вводити крем за допомогою ультразвуку (фонофорез) під наглядом фахівців.

Витрата крему при ультразвуковому введенні становить 1 мл на 15 см² озвучуваної площі тіла.

Для фонофорезу краще використовувати атестовані ультразвукові апарати.

Курс застосування 20-30 днів щодня (можливі перерви 1-2 дня).

При необхідності курс повторюють через 1-2 місяці.

Особливості застосування

Не застосовувати при секвестрації грижі диску та фораменальному розташуванні секвестру.

Застереження

Не рекомендується застосовувати при гострих запальних процесах у тканинах.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до фізіопроцедур або будь-якого з компонентів крему (алергічні реакції).

Форма випуску

Туба пластикова місткістю 50 мл. По 1 тубі в картонній коробці.

Умови зберігання

Зберігати в прохолодному місці при температурі від +5 до +25 °С.

Термін придатності

Дата виробництва (серія) вказана на шві туби.

Термін придатності - 24 місяці від дати виробництва

Виробник

ПраТ ФФ «Віола», Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75, на замовлення ТОВ «Медвейв»