

Склад

«Дисгінол» вагінальні супозиторії

Склад: 1 вагінальний супозиторій містить: октенідину дигідрохлорид - 2 мг (mg); феноксіетанол - 40 мг (mg); натрію гіалуронат - 25 мг (mg); д-пантенол - 50 мг (mg); консервант - 9,5 мг (mg); маса супозиторна до 1,9 г (g)

Рекомендації щодо застосування

Дисгінол призначений для застосування з метою нормалізації фізіологічного стану піхви, у т. ч.:

- для санації вагінальних шляхів;
- при бактеріальному вагінозі
- при гострому і хронічному вагініті
- при неспецифічному кольпіті
- при ендо- та екзоцервіті
- при ектопії шийки матки
- до та після пологів
- при абортах
- при постановці ВМС
- при оперативних втручаннях при гінекологічних захворюваннях
- для покращення регенерації слизової піхви і шийки матки після застосування деструктивних методів лікування.

Опис

Виріб медичний **вагінальні супозиторії «Дисгінол»** — потужний сануючий засіб нового покоління, профілакує розвиток та сприяє регресу запалення в поєднанні з регенеруючим і метаболічним ефектами.

Комбінація октенідину дигідрохлориду і феноксіетанолу значно посилює антимікробну дію і перешкоджає розвитку резистентності збудників.

Октенідину дигідрохлорид має широкий спектр протимікробної, противірусної та протигрибкової дії за рахунок міцного зв'язування з глікополісахаридами клітинних стінок патологічних мікроорганізмів, що призводить до руйнування цитоплазматичної мембрани і загибелі патогенного збудника. Октенідину дигідрохлорид надає протимікробну активність відносно широкого спектра грампозитивних і грамнегативних аеробів і анаеробів, грибів роду дерматофітів, ліпофільних вірусів, дріжджів, найпростіших, у т. ч. MRSA, *Trichomonas vaginalis*, *Chlamidia* spp., *Ureaplasma* spp., *Mycoplasma* spp., *Gardnerella vaginalis*, *Neisseria gonorrhoeae*. Активний при наявності гнійних і кров'янистих виділень. Не викликає розвиток резистентності. При інтравагінальному використанні не настає зміна функціональної активності лактобацил, октенідину дигідрохлорид не проникає в кровотік і не чинить системну дію.

Феноксіетанол — ліпофільна речовина, ефективна проти грамнегативних і грампозитивних бактерій, а також проти дріжджів *Candida albicans*. Посилює дію октенідину дигідрохлориду.

Д - пантенол – похідна пантотенової кислоти, яка є складовою коферменту А. Стимулює клітинний метаболізм та регенерацію слизових оболонок, збільшує міцність колагенових волокон та прискорює мітоз

Гіалуронова кислота (у вигляді натрію гіалуронату), будучи природним молекулярним біополімером, має унікальну здатність зв'язувати і утримувати молекули води, що супроводжується активним зволоженням піхви; сприяє загоєнню і зняттю запальних реакцій.

Вагінальні супозиторії «Дисгінол» не чинять системної дії і добре переносяться.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Спосіб застосування

Дисгінол застосовують для дорослих вагінально 1-2 рази на добу по одному супозиторію протягом 7-10 днів. Можливе збільшення тривалості курсу до 15-20 днів. Вагінальний супозиторій вводять глибоко в піхву в положенні лежачи на спині, злегка зігнувши ноги. Перед застосуванням ретельно вимити руки!

Особливості застосування

В окремих випадках можлива поява неприємних відчуттів у вигляді печіння, які швидко проходять. У разі посилення неприємних відчуттів застосування супозиторіїв слід припинити і звернутися за консультацією до лікаря. Не застосовувати одночасно з йодовмісними антисептиками. Не ковтати, уникати потрапляння в очі.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Можливе застосування у вагітних, починаючи з 2-го триместру вагітності.

Застосування у 1-му триместрі та в період лактації можливе, якщо передбачувана користь матері перевищує можливий ризик для плода чи дитини.

Термін придатності

24 місяці з дати виробництва.

Форма випуску

Супозиторії вагінальні.

Упаковка

Супозиторії вагінальні по 1,9 г (g), 10 штук у картонній коробці разом з інструкцією із застосування.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в сухому та чистому місці, захищеному від прямого сонячного світла, в недоступному для дітей місці при температурі від 4°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Виробник

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком», Україна, 61001, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Адреса виробничих потужностей:

ТОВ ВТФ «Фармаком», Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 106.

Медичний виріб. Зареєстровано Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, та внесено до реєстру осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг за № 10412, декларація від 06.12.2021.