

Склад

діючі речовини: ібупрофен - 50 мг, левоментол - 30 мг;

допоміжні речовини: вода очищена, етанол денатурований 96%, пропіленгліколь, діізопропаноламін, карбомер.

Лікарська форма

Гель для зовнішнього застосування прозорий, із запахом ментолу.

Фармакотерапевтична група

НПЗЗ для зовнішнього застосування.

Фармакодинаміка

Комбінований препарат для зовнішнього застосування, містить ібупрофен і левоментол.

Ібупрофен - НПЗП, при зовнішньому застосуванні чинить знеболювальну, протизапальну, антиексудативну дію при симптоматичному лікуванні суглобів, сухожиль, зв'язок, м'язів.

Левоментол (ментол) має місцевоподразнюючу дію, що обумовлює розвиток швидкого знеболюючого ефекту препарату.

Діп Риліф зменшує біль і запалення, ефективний при болях в суглобах при русі і в спокої, зменшує ранкову скутість суглобів.

Показання

- Захворювання опорно-рухового апарату (в т.ч. ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз з корінцевим синдромом, радикуліт, люмбаго, ішіас);
- ревматичні захворювання м'яких тканин (в т.ч. тендовагініт, бурсит, ураження періартикулярних тканин);
- посттравматичне запалення м'яких тканин і суглобів (у т.ч. внаслідок розтягнень, перенапруг і ударів);
- болі в спині, попереку.

Протипоказання

- Бронхіальна астма, що виника після прийому ацетилсалицилової кислоти или других НПЗЗ;
- порушення цілісності шкірних покривів;
- вагітність;
- період лактації (грудного вигодовування);
- дитячий вік до 14 років;
- підвищена чутливість до ибупрофена или до інших компонентів препарату.

З обережністю слід застосовувати препарат при загостренні печінкової порфірії, ерозивно-виразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту, тяжких порушеннях функції печінки і нирок, хронічній серцевій недостатності, бронхіальній астмі, у пацієнтів похилого віку.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Діп Риліф може посилювати дію препаратів, що викликають фотосенсибілізацію.

Клінічно значущої взаємодії з іншими лікарськими засобами не описана.

Особливості застосування

Пацієнтам із захворюваннями нирок перед застосуванням препарату потрібна консультація лікаря.

Гель слід наносити на неушкоджену шкіру, уникаючи попадання потрапляння в очі, на слизові оболонки та відкриті ранові поверхні. Після нанесення не слід накладати оклюзійну (повітронепроникну) пов'язку.

При тривалому застосуванні препарату у великих дозах з'являється ризик розвитку побічних ефектів.

Використання в педіатрії

Діп Риліф не слід застосовувати у дітей до 14 років без відповідної рекомендації лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано застосування препарату при вагітності та в період лактації (грудного вигодовування).

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо.

Дорослим і дітям старше 14 років невелику кількість гелю (3-5 см) наносять до 4 разів/добу тонким шаром на шкіру над вогнищем запалення і злегка втирають. Після застосування Дип Риліф слід вимити руки, якщо вони не є об'єктом лікування.

Тривалість застосування препарату без консультації лікаря - не більше 10 днів.

Діти

Діп Риліф не слід застосовувати у дітей до 14 років без відповідної рекомендації лікаря.

Передозування

Випадки передозування не описані.

Побічні реакції

Алергічні реакції: генералізована шкірний висип, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспастические реакції, фотосенсибілізація, екзема, контактний дерматит (в т.ч. свербіж, почервоніння, набряклість оброблюваної ділянки шкіри, папули, везикули, лущення).

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Препарат слід зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ° С.

Упаковка

По 15 г гелю в тубі.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).