

Склад

1 мікроклізма (туба-канюля) містить 5 мл) розчину: сорбіту розчин 70% – 3965,0 мг, натрію цитрат – 450,0 мг, натрію лаурилсульфоацетат, гліцерин, вода очищена.

Опис

Делакс мікро (Delax micro) — комбінований проносний засіб для ректального застосування, сприяє пом'якшенню та розрідженню калових мас і полегшенню дефекації. За рахунок витіснення зв'язаної рідини з калових мас, а також збільшення надходження води в просвіт кишечника Делакс мікро (Delax micro) полегшує випорожнення кишечника.

Сорбіту розчин стимулює надходження води в просвіт кишечника, сприяє збільшенню об'єму і розм'якшенню калових мас, а також надає опосередкований вплив на рецептори слизової оболонки кишечника, стимулюючи перистальтику і полегшуючи дефекацію.

Натрію цитрат витісняє зв'язану воду, яка міститься в калових масах.

Натрію лаурилсульфоацетат – це нетоксичний зволожувач, який не викликає подразнень та сприяє розрідженню кишкового вмісту (полегшує проникненню розчину ректального в кал).

Гліцерин пом'якшує та змащує затверділі фекальні маси, та полегшує проходженню їх по товстій кишці.

Показання

Делакс мікро (Delax micro) сприяє розм'якшенню калових мас і полегшує випорожнення кишечника (проносний ефект настає через 5 - 20 хвилин). Профілактика закрепи у пацієнтів, які не можуть напружуватися при дефекації. Може бути рекомендований для очищення товстого кишечника перед проведенням рентгенологічного або ендоскопічного (ректоскопія) дослідження шлунково-кишкового тракту.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів. Не застосовувати дітям віком до 6 років.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати ректально. Перед використанням Делакс мікро (Delax micro) ретельно вимити руки і очистити область анального отвору.

Розчин вводити у пряму кишку за допомогою трубки-канюлі (мікроклізми):

1. Зняти захисний ковпачок.
2. Ввести загострену частину трубки-канюлі у пряму кишку і випорожнити під тиском вміст усієї туби.
3. Вийняти тубу-канюлю, не послаблюючи тиску.
4. У разі потреби краплю гелю можна використати для змащення канюлі.

Дорослим та дітям старше 6 років: 1 туба-канюля на добу.

Підготовка до ендоскопічного обстеження прямої кишки: 1 туба-канюля за 5-20 хвилин до запланованого часу випорожнення. Не рекомендується тривале застосування виробу.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 2 °С до 25 °С в недоступному для дітей місці. Тлумачення символів, які наведені на маркуванні.

Упаковка

По 5 мл у тубі-канюлі, по 4 туби-канюлі в пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».