

Склад

Склад одного стік-пакета, 20 г гелю:

Активні компоненти	діоксид кремнію високодисперсний – 1,6 г
Допоміжні компоненти	вода очищена, загущувач натрій-карбоксиметилцелюлоза, консервант сорбат калію, регулятор кислотності лимонна кислота, підсолоджувач сукралоза, ароматизатор «Банан»

Містить підсолоджувач.

Показання

Може бути рекомендований лікарем як джерело ентеросорбенту діоксиду кремнію, з метою створення оптимальних дієтологічних умов для нормалізації складу кишкової флори, для видалення з організму екзо- та ендогенних токсинів при побутових, промислових та харчових отруєннях, нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

Спосіб застосування та дози

Дітям від 3х до 14 років по 1 стік-пакету 2 рази на добу;

Дорослим та дітям від 14 років 1 стік-пакет 3 рази на добу.

Використовувати за годину до або через годину після прийому їжі чи медикаментів.

Перед вживанням суспензію зробити однорідною, шляхом розминання пакета. Вміст пакета виливають у столову ложку або безпосередньо у ротову порожнину. Бажано запивати склянкою води.

Термін вживання визначається лікарем, зазвичай від 3 до 10 діб. Можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

Застереження

Індивідуальна чутливість до компонентів. Виразкова хвороба шлунку та 12-ти палої кишки в стадії загострення, шлункові та кишкові кровотечі, виразки та ерозії слизової оболонки кишечника, кишкова непрохідність.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Містить підсолоджувач.

Форма випуску

Стік-пакети по 20 г гелю.