

Склад

Панкреатин – 200,0 мг; капсула: желатин, барвник: титану діоксид, заліза оксид жовтий, заліза оксид червоний, кармоїзин; глазируючий агент: сополімер метакрилової кислоти та сополімер метакрилової кислоти та етилакрилату (1:1); зволожуючий агент: гідроксипропілметилцеллюлоза; дезінтегруючий агент: карбоксиметилцеллюлоза натрієва сіль кроссв'язана.

Опис

Панкреатин - це суміш травних ферментів, що виробляються підшлунковою залозою, включаючи амілазу, ліпазу та протеазу. Панкреатин може використовуватися людьми, які природним чином не виробляють достатньої кількості власного панкреатину. Ця форма панкреатину часто відома як панкреліпаза, оскільки містить більшу частку ліпази, ніж природний панкреатин.

Найважливішою ознакою того, що вам може знадобитися панкреатин, є недостатнє вироблення панкреатину підшлунковою залозою. Виробництво панкреатину зазвичай знижується з віком, тому багато людей можуть отримати користь від панкреатину, досягнувши середнього віку.

Основними травними ферментами є:

Амілаза – бере участь у засвоєнні вуглеводів, особливо при їх споживанні у великих кількостях.

Протеаза – бере участь у засвоєнні білків, корисна для активних людей, які доповнюють свій раціон постійним споживанням білка.

Ліпаза – бере участь у засвоєнні ліпідів, які, як правило, потребують тривалого перетравлення.

Gastrigen-Pro 10 000 (Gastrigen-Pro) заповнює потребу в травних ферментах (протеаза, амілаза та ліпаза), які беруть участь у перетравленні їжі.

Показання до використання

Як додаткове джерело ферментів підшлункової залози (ліпази, амілази, протеази) з метою нормалізації процесів травлення у випадках вживання їжі, яка важко перетравлюється, жирної або незвичної їжі. Дозволяє попередити розлади

травлення (діарея, метеоризм) та сприяє більш повному засвоєнню корисних речовин у тонкому кишечнику.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вагітні або жінки, що годують груддю, перш ніж вживати цей продукт, повинні проконсультуватись із лікарем. Не використовувати після закінчення кінцевого строку придатності. Барвник кармоїзин може негативно впливати на активність та увагу дітей. Містить лактози моногідрат. Протипоказаний людям із непереносимістю лактози.

Спосіб застосування та дози

Всередину, по 1 капсулі при кожному прийомі їжі, запивати значною кількістю питної води. Перед застосуванням потребує консультації лікаря.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці, у сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25° C та не нижче 0° C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери в упаковці.