

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 г гелю містить лідокаїну гідрохлориду моногідрату – 20 мг, екстракт квітів ромашки (*Matricaria recutita* L.) (1:4-5) (екстрагент етанол 50 % (об./об.) з 1,37 % трометамолу) – 185 мг;

*допоміжні речовини:* бензалконію хлориду розчин 50 %, олія кори коричневого дерева, сахарин натрію, карбомери, трометамол, кислота мурашина 98 %, етанол 96 %, вода очищена.

## **Лікарська форма**

Гель.

*Основні фізико-хімічні властивості:* жовто-коричневого кольору гомогенний гель без твердих кристалів.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби для місцевого застосування у стоматології.

Код АТХ А01А D11.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

Комбінація активних речовин у препараті має болезаспокійливі, протизапальні та антибактеріальні властивості.

Лідокаїн є сильним місцевоанестезуючим засобом амідного виду. Механізм його дії ґрунтується на стабілізації клітинних мембран за рахунок блокади натрієвих каналів.

Ромашка або рідкий екстракт ромашки містить складну суміш структурно різних протизапальних і антибактеріальних властивостей, об'єднаних для підвищення загального лікувального ефекту. Терапевтично найбільш важливими є сесквітерпени, що нараховують понад 50 % активних складових частин ромашки. Протизапальна дія ромашки зумовлена головним чином наявністю хамазулену та (-)-альфа-бісабололу, що також мають антибактеріальні та протигрибкові властивості.

## **Показання**

Лікування легких запальних уражень ясен і слизової оболонки порожнини рота.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до лідокаїну або до інших місцевоанестезуючих засобів амідного виду, до ромашки або до інших компонентів препарату.

Ушкодження слизової оболонки порожнини рота.

## **Особливості щодо застосування**

Високі дози не слід застосовувати довше зазначеного періоду без консультації з лікарем.

Слід уникати потрапляння препарату в очі або на відкриті рани. Руки слід ретельно вимити після використання Камістад® - гель Н.

Препарат містить розчин бензалконію хлориду, що може спричинити подразнення шкіри.

Препарат може спричинити оніміння язика, тому, після застосування препарату потрібно з обережністю вживати їжу та напої.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Немає клінічного досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю, тому препарат не слід застосовувати у ці періоди.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не виявлено впливу на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим смужку Камістад® - гель Н завдовжки ½ см наносити на уражені ділянки слизової оболонки порожнини рота 3 рази на добу, злегка масажуючи. Курс лікування визначає індивідуально лікар залежно від перебігу захворювання.

Дітям віком від 12 років смужку Камістад® - гель Н завдовжки ½ см наносити на слизову оболонку порожнини рота. Не застосовувати більше 3 разів протягом 24 годин.

Камістад® - гель Н застосовувати до зменшення запалення слизової оболонки порожнини рота.

*Діти.*

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

### **Передозування**

На даний час жодного випадку щодо інтоксикації або передозування препаратом невідомі.

### **Побічні ефекти**

Частота проявів випадків побічної дії визначається за такими критеріями:

дуже часто ( $\geq 1/10$ ); часто ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ); нечасто ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ); рідко ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ ); дуже рідко ( $\geq 1/10000$  або невідомо).

*З боку шкіри та підшкірної клітковини*

Нечасто: після застосування гелю може виникнути тимчасове легке печіння, подразнення, почервоніння.

*З боку імунної системи*

Дуже рідко: оскільки продукт містить лідокаїн, цинамон і ромашку, можуть виникати алергічні реакції, включаючи контактні алергічні реакції, шкірні висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк. Такі реакції також можуть виникати у пацієнтів з гіперчутливістю до рослин з родини Айстрових (полин) та Перуанського бальзаму (через перехресну реакцію).

Якщо виникли будь-які реакції гіперчутливості, застосування Камістад® - гель Н слід припинити та обов'язково звернутися за консультацією до лікаря.

### **Термін придатності**

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 30 °C.

**Упаковка**

По 10 г гелю в тубі; по 1 тубі в картонній коробці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серії).