

Склад

1 мл сиропу містить екстракт суміші трав (1:1) Щучки дернистої (Herba Deschampsia Caespitosa L.) та Війника наземного (Herba Calamagrostis epigeios L.) в кількості, еквівалентній не менше 0,0035 мг суми флавоноїдів у перерахунку на рутин; розчинник вода очищена, підсолоджувач сорбіт (E420), згущувач пропіленгліколь (E 1520), консервант натрію сульфід (E 221).

Рекомендації щодо застосування

Сироп ІМУНОФЛАЗІД® ЛАЙТ може бути рекомендований лікарем для вживання в якості дієтичної добавки до повноцінного раціону харчування дорослим та дітям віком від 3 років, як джерело комплексу біологічно-активних речовин рослинного походження (флавоноїдів) з метою створення оптимальних умов для підтримки нормального функціонування імунної системи та природнього захисту організму при впливі шкідливих зовнішніх факторів (інфекційних вірусних навантажень) в період поширення сезонних захворювань.

Загальні властивості

Екстракт суміші трав (див. Склад), є джерелом флавоноїдів - біологічно-активних речовин, здатних сприятливо впливати на стан імунної системи, підтримувати природні захисні функції організму. Флавоноїди мають широкий спектр біологічної активності, в тому числі беруть участь в окисно-відновних процесах, виконуючи антиоксидантну функцію, та захищають клітини від руйнування.

Спосіб застосування

Перед вживанням флакон з сиропом необхідно збовтати. Дорослим та дітям віком від 3-х років сироп слід приймати за 20-30 хв. до їди. Вік (роки)/Дозування (мл):

- від 3 до 4 років - по 1,5 мл 2 рази на добу;
- від 4 до 6 років - по 2мл 2 рази на добу;
- від 6 до 9 років - по 2,5 мл 2 рази на добу;
- від 9 до 12 років - по 3 мл 2 рази на добу;
- від 12 років та дорослі - по 4,5 мл 2 рази на добу.

Застереження при застосуванні

Не вживати при індивідуальній непереносимості інгредієнтів, виразковій хворобі шлунку або 12-типалої кишки в період загострення, аутоімунних захворюваннях.

При хронічному гастродуоденіті у разі його загострення сироп необхідно приймати через 1,5-2 години після приймання їжі.

Не перевищувати добову рекомендовану дозу.

Не вживати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

Вагітним та жінкам в період годування груддю перед застосуванням обов'язкова консультація лікаря.

Умови зберігання

Номер партії співпадає з датою виробництва.

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

Після першого відкриття флакона зберігати його закритим в оригінальній упаковці не більше 30 діб