

Склад

діючі речовини: гепарин натрію, бензокаїн;

1 г мазі містить гепарину натрію 100 ОД, бензокаїну 40 мг;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, олія соняшникова, олія кукурудзяна, бензилнікотинат, гліцерин, емульгатор Т-2, метилпарагідроксибензоат (Е 218), вода очищена.

Лікарська форма

Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при варикозному розширенні вен. Гепарин, комбінації.

Код АТХ С05В А53.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Гепаринова мазь – антикоагулянт прямої дії, чинить протизапальну та місцеву знеболювальну дію, запобігає утворенню тромбів, сприяє розсмоктуванню утворених тромбів.

Фармакокінетика

Не визначалась.

Показання

Профілактика та лікування тромбофлебиту поверхневих вен, постін'єкційний та постінфузійний флебіт, трофічні виразки гомілки, слоновість, поверхневий

перифлебїт, лїмфангїїт; зовнїшнїй геморой, запалення гемороїдальних вузлїв пїсля пологїв; поверхневий мастит; локалїзованї інфїльтрати та набряки, травми та удари без порушення цїлїсностї шкїрних покривїв (у тому числї м'язовїї тканини, сухожиль, суглобїв).

Протипоказання

Гїперчутливїсть до будь-якого з компонентїв препарату. Виразково-некротичнї процеси, травматичне порушення цїлїсностї шкїрних покривїв, вїдкритї інфїкованї рани, геморагїчний дїатез, пурпура, тромбоцитопенїя, гемофїлія, схильнїсть до кровотеч.

Взаємодїя з їншими лїкарськими засобами

Дїю мазї посилюють антикоагулянти, ацетилсалїцилова кислота та їншї нестероїднї протизапальнї засоби. Ефективнїсть мазї послаблюють препарати наперстянки, тетрациклїни, нїкотин, антигїстамїннї препарати. Застосування гепарину може сприяти подовженню протромбїнового часу у хворих, якї застосовують пероральнї антикоагулянти. Не слїд застосовувати препарат разом з лїкарськими засобами для мїсцевого застосування, наприклад з препаратами, що мїстять тетрациклїн, гїдрокортизон, салїцилову кислоту, з антикоагулянтами.

Особливостї застосування

При тривалому застосуванні мазї на великих дїлянках та одночасному застосуванні пероральних лїкарських засобїв, якї впливають на згортальну систему кровї та/або кровотворення, слїд контролювати час згортання та протромбїновий час. При необхідностї тривалого курсу лїкування ї на значних дїлянках ураження у жїнок вїком вїд 65 рокїв рекомендується аналогїчний контроль.

Не слїд наносити на вїдкритї рани при наявностї гнїйних процесїв. Застосування мазї не рекомендується при глибокому венозному тромбозї.

Препарат не слїд призначати при кровотечах, наносити на слизовї оболонки, інфїкованї дїлянки шкїри, в очї та на дїлянки навколо очей, на виразки та пухирї. У разї розладїв згортання кровї не рекомендується наносити на великї дїлянки шкїри.

Застосування у перїод вагїтностї або годування груддю

Не застосовувати препарат у перїод вагїтностї або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовувати дорослим місцево.

При тромбофлебіті поверхневих вен кінцівок мазь нанести на зону ураження тонким шаром (із розрахунку 0,5-1 г (2-4 см мазі) на ділянку діаметром 3-5 см) та обережно втирати у шкіру 2-3 рази на добу протягом 3-7 діб до зникнення явищ запалення. Можливість проведення тривалішого курсу лікування визначає лікар.

При тромбозі гемороїдальних вен мазь нанести на серветку з тканини, яку застосовувати безпосередньо на гемороїдальні вузли та зафіксувати пов'язкою (можливе застосування тампона з нанесеною на нього маззю, який слід вводити у задній прохід) 2-3 рази на добу до зникнення ознак запалення, в середньому 3-14 діб. Можливість тривалішого застосування визначає лікар індивідуально.

Передозування

Через низький рівень всмоктування Гепаринової мазі її передозування є неможливим.

Побічні реакції

Почервоніння, висипи на шкірі, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, геморагії, іноді можливе виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів. Можлива місцева подразнювальна дія, що проявляється у вигляді печіння, свербіжу або незначного набряку шкіри. Наявність у складі препарату метилпарагідроксибензоату (Е 218) може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені), при нанесенні на великі ділянки шкіри можливі системні алергічні реакції, гіперемія.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Житомирська ФФ, Україна.