

Склад

діюча речовина: ромашки квітки (Matricariae flores);

1 фільтр-пакет містить: ромашки квіток (Matricariae flores) 1,3 г.

Лікарська форма

Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: подрібнена сировина: суміш подрібнених, частково осипаних квіткових кошиків, трубчастих та несправжньоязичкових квіток, квітколож. Колір від світло-жовтого до жовтувато-зеленого з білими, коричнюватими вкрапленнями;

порошок крупний: шматочки різної форми квіткових кошиків, квітколож, трубчастих та несправжньоязичкових квіток, трубчасті квітки. Колір від світло-жовтого до жовтувато-зеленого з білими, коричнюватими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості

Біологічно активні речовини препарату чинять спазмолітичну, болезаспокійливу, протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну дію; знижують алергічні реакції, посилюють процеси регенерації, підвищують секреторну діяльність травних залоз, збуджують апетит, усувають спазми кишечника, зменшують бродильні процеси.

Показання

Внутрішньо застосовувати при гастритах, запальних захворюваннях печінки та жовчного міхура, ентероколитах, метеоризмі, застудних захворюваннях. Зовнішньо – при запальних захворюваннях порожнини рота і горла.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Застосування у період вагітності або годування груддю

За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплом вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 склянці, дітям віком 12-14 років – по $\frac{2}{3}$ склянки, 7-12 років – по $\frac{1}{2}$ склянки, 3-7 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, 1-3 роки – по 2 столові ложки, 6 місяців-1 рік – по 1 десертній ложці. Зовнішньо настій застосовувати для полоскань 3-4 рази на добу.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Застосовувати дітям віком від 6 місяців за призначенням лікаря.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1,3 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».