

Склад

діючі речовини: сухий екстракт солодки голої, сухий екстракт імбиру лікарського, сухий екстракт ембліки лікарської, ментол;

1 льодяник містить сухого екстракту солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) (5: 1) (екстрагент: вода очищена) 15,0 мг сухого екстракту імбиру лікарського (*Zingiber officinale*) (10: 1) (екстрагент: вода очищена) 10,0 мг сухого екстракту ембліки лікарської (*Emblica officinalis*) (4: 1) (екстрагент: вода очищена) 10,0 мг ментолу 7 мг;

допоміжні речовини: сахароза, глюкози розчин, гліцерин, кислота лимонна моногідрат, ароматизатор м'ятний, масло апельсина, барвник Хіноліновий жовтий (Е 104).

Лікарська форма

Льодяники.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі двоопуклі льодяники від зеленувато-жовтого до жовтого кольору з апельсиновим смаком.

Фармакотерапевтична група

Засоби для застосування при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС R05X.

Фармакокінетика

Комбінований лікарський засіб з відхаркувальну і протизапальну дію.

Фармакологічні властивості препарату обумовлені компонентами, що входять до його складу.

Солодки голої екстракт (*Glycyrrhiza glabra* L.) проявляє протизапальну, спазмолітичну і відхаркувальну дію. Імбиру лікарського екстракт (*Zingiber officinalis* Rosc.) Надає протизапальну і болезаспокійливу дію. Ембліки лікарської екстракт (*Emblica officinalis* Gaetn.) Має протизапальну та жарознижувальну дію. Ментол чинить спазмолітичну та антисептичну дію.

Показання

Симптоматична терапія гострих і хронічних захворювань верхніх відділів дихального тракту, що супроводжуються кашлем (фарингіт, ларингіт, включаючи

«лекторський» ларингіт, трахеїт, бронхіт).

Протипоказання

- Підвищена чутливість до компонентів препарату;
- порушення функцій печінки і нирок;
- захворювання, що супроводжуються порушеннями жовчовиділення (жовчнокам'яна хвороба і непрохідність жовчних проток);
- артеріальна гіпертензія;
- гіпокаліємія;
- тяжкий ступінь ожиріння;
- спазмофілія;
- бронхіальна астма;
- цукровий діабет;
- дитячий вік.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Доктор Мом®, льодяники, не слід застосовувати одночасно з протикашльовими препаратами та препаратами, що пригнічують утворення мокротиння, так як це перешкоджає відхаркуванню розрідженого мокротиння.

Гіпокаліємія (в результаті надмірного застосування кореня солодки) може посилюватися при взаємодії з серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами та препаратами, що впливають на серцевий ритм (наприклад, хінідин). При спільному застосуванні з препаратами, які зумовлюють розвиток гіпокаліємії (тіазидні та петльові діуретики, адренокортикостероїдні і проносні лікарські засоби) може бути порушення електролітного балансу, тому не слід застосовувати тривалий час препарат одночасно з вказаними вище лікарськими засобами.

Може посилювати абсорбцію сульфату гліцерину.

При спільному застосуванні з варфарином потрібна обережність через можливість виникнення кровотеч внаслідок підвищення МНО (міжнародне нормалізоване відношення).

Особливості застосування

Якщо симптоми захворювання зберігаються більше 2 дні і супроводжуються головним болем, нудотою або блювотою, необхідно звернутися до лікаря.

Оскільки препарат містить глюкозу і сахарозу, пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, синдромом порушення всмоктування глюкози / галактози та дефіцитом сахарази / ізомальтази прийом препарату не рекомендується.

Пацієнтам з шлунково-стравохідного рефлюксу (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Застосування препарату в зазначеній дозі не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з потенційно небезпечними механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат протипоказаний до застосування під час вагітності. У разі необхідності прийому препарату протягом лікування годування груддю слід припинити.

Спосіб застосування та дози

Дорослим приймати по 1 льодянику кожні 2 години (повільно розсмоктувати).

Максимальна добова доза - 10 льодяників.

Тривалість лікування - не більше 3 днів без консультації лікаря.

Діти

Не рекомендується призначати до 18 років.

Передозування

Тривале застосування препаратів солодки в надмірних дозах може призвести до гіпокаліємії; в окремих випадках можливі гіпокаліємічний міопатія і міоглобінурія. Може бути біль в області серця, порушення серцевого ритму, зрідка - ураження слизової оболонки шлунка. У разі передозування проводять симптоматичне лікування.

Побічні реакції

Алергічні реакції, включаючи висип, в тому числі везикулярне, папульозні, свербіж, гіперемія шкіри, кропив'янка, ангіоневротичний набряк.

Можливі побічні реакції: порушення водно-електролітного балансу (поява набряків), підвищення артеріального тиску, болі в області серця, порушення серцевого ритму (при одночасному застосуванні декількох препаратів з вмістом солодки), дерматит, запаморочення.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 30 ° С в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

За 4 льодяники в Стрипі, по 5 стрипів у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Юник Фармасьютікал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд.»).

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Округ № 101/2 та 102/1, Даман Індастріал Естейт, Ейрпорт Роуд, село Кадайя, Даман - 396210, Індія

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).