

Склад

діюча речовина: рідкий екстракт кореневищ з коренями елеутерококу колючого (*Eleuterococcus senticosus*) (1:1) (екстрагент – етанол 40%);

1 флакон містить рідкого екстракту кореневищ з коренями елеутерококу колючого (*Eleuterococcus senticosus*) (1:1) (екстрагент – етанол 40%) 50 мл.

Лікарська форма

Екстракт рідкий.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина темно-коричневого кольору, в тонкому шарі прозора, зі специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.

Фармакотерапевтична група

Тонізуючий засіб. Код АТХ А13А.

Фармакодинаміка

До складу елеутерококу колючого кореневищ з коренями входять елеутерозиди А, В, В1, С, Д, Е, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль та інші компоненти. Завдяки присутності елеутерозидів препарат підвищує фізичну та розумову працездатність, гостроту зору, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, покращує обмін речовин, чинить незначну стимулюючу гонадотропну та гіпоглікемічну дію.

Фармакокінетика

Не вивчали.

Показання

Фізична і розумова перевтома, неврастенії та психостенії, функціональне виснаження центральної нервової системи, яке супроводжується зниженням працездатності, дратівливістю і безсонням. Вегетоневрози, післяопераційний період; у поєднанні з іншими засобами – при гострій та хронічній променевій хворобі.

Протипоказання

Гіперчутливість до компонентів препарату, гіпертермічний синдром, артеріальна гіпертензія, підвищена збудженість, епілепсія, гострі інфекційні захворювання, інфаркт міокарда, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Препарат може потенціювати дію засобів, які стимулюють центральну нервову систему, аналептиків, гіпоглікемічних засобів та пригнічувати дію седативних і снодійних препаратів.

Особливості застосування

При прийомі препарату в другій половині дня можливе безсоння.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат містить етанол 40%, тому під час застосування препарату слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами та роботі з потенційно небезпечними механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат містить етанол 40%, тому препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням збовтати. Препарат призначати внутрішньо за 30 хвилин до їди.

Дорослим приймати по 20-30 крапель 1 раз на добу, дітям віком від 12 років призначати з розрахунку 1 крапля на рік життя дитини 1 раз на добу, попередньо розвести невеликою кількістю води, у першій половині дня (тобто до 15 годин). Курс лікування становить 25-30 днів, при необхідності повторювати через 1-2 тижні.

Діти

Не рекомендується застосовувати препарат дітям віком до 12 років, оскільки він містить етанол 40%.

Передозування

Можливе підвищення артеріального тиску, порушення сну, порушення ритму серця, зниження працездатності, підвищена збудливість.

Терапія симптоматична.

Побічні реакції

Препарат зазвичай переноситься добре, проте у пацієнтів, які мають гіперчутливість, можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж);

- *з боку центральної нервової системи:* збудження, порушення сну, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності;
- *з боку серцево-судинної системи:* тахікардія, підвищення артеріального тиску.

При тривалому застосуванні (більше 2 місяців) може спричинити спазм м'язів, порушення з боку травного тракту.

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 мл у флаконах скляних або полімерних.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).