

Склад

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ВЕНОТОН[®] (VENOTON)

Склад:

діючі речовини: 1 мл препарату містить настойки з суміші лікарської рослинної сировини «Венотон[®]» (1:10) (екстрагент — етанол 40 %): *Hippocastani semina* (каштану кінського насіння) 40 мг; *Sophorae japonicae fructus* (софори японської плоди) 15 мг; *Avenae fructus* (вівса плоди) 15 мг; *Coryli folia* (ліщини листя) 10 мг; *Sorbi fructus* (горобини плоди) 10 мг; *Meliloti herba* (буркуну трава) 5 мг; *Chelidonii herba* (чистотілу трава) 5 мг;

допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовтуватого-коричневого до коричневого кольору з приємним запахом. Під час зберігання можливе випадання осаду.

Фармакотерапевтична група.

Капіляростабілізуючі засоби.

Код АТХ C05C X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Венотон® – венотонізуючий, капіляропротекторний, антиексудативний, протизапальний та протинабряковий засіб.

Екстракт каштану кінського чинить венотонізуючу, капіляропротекторну, протинабрякову, антиагрегантну та антикоагулянтну дію, що зумовлена вмістом флавонового глікозиду ескуліну та сапоніну есцину. Ескулін зменшує проникність капілярів, стимулює антитромботичну активність сироватки крові, збільшує вироблення антитромбіну в ретикулоендотеліальній системі судин, посилює кровонаповнення вен, особливо у разі наявності патологічних змін. Есцин знижує в'язкість крові.

Основною діючою речовиною софори японської є рутин, який має властивість ущільнювати стінки судин, зменшуючи їх ламкість. Відновлює еластичність судин, чинить заспокійливу та протизапальну дію.

Амінокислотний склад вівса сприяє виведенню зайвого холестерину з організму, чинить загальнозміцнюючу дію.

Плоди горобини чинять протизапальну, капіляропротекторну, гіпотензивну дію.

Листя ліщини чинить протизапальну, судинозвужувальну дію, зміцнює стінки кровоносних судин.

Біологічна активність трави буркуну визначається наявністю в ній кумарину. Кумарин підвищує артеріальний тиск, збільшує хвилинний об'єм серця, покращує мозкове та периферичне кровопостачання.

Трава чистотілу чинить протизапальну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Захворювання вен нижніх кінцівок: варикозне розширення вен, венозна недостатність (набряки нижніх кінцівок, судоми литкових м'язів, відчуття оніміння, болю та тяжкості в ногах), виразки гомілки, флебіт, тромбофлебіт; гемороїдальні вузли, біль і набряки при забитті м'язових тканин та суглобів; розтягнення та перенапруження зв'язок; гематоми травматичного походження.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу, внутрішні кровотечі, гостра та хронічна ниркова недостатність, захворювання печінки в анамнезі, стенокардія, бронхіальна астма, неврологічні синдроми, епілепсія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат не слід застосовувати одночасно з аміноглікозидами, оскільки збільшується нефротоксичність. У разі необхідності одночасного призначення з антикоагулянтами дозу останніх потрібно зменшувати. Не слід вживати з антибіотиками цефалоспоринового ряду.

Особливості застосування.

Лікарський засіб застосовувати тільки розведеним. Під час зберігання можливе випадання осаду, однак це не впливає на ефективність препарату. Перед застосуванням збовтати.

У випадку раптової появи незвичних серйозних проявів, особливо тільки на одній нозі, таких як набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруженості або жару, біль, хворому слід негайно звернутися до лікаря, оскільки ці ознаки можуть бути симптомами тромбозу вен ніг.

Слід обов'язково застосовувати інші неінвазивні методи лікування, такі як накладання компресів на ноги, носіння підтримуючих еластичних панчіх або обливання холодною водою. При застосуванні лікарського засобу слід контролювати функцію нирок. Прийом препаратів чистотілу допустимий лише за призначенням лікаря та під його наглядом.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Настойку не застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат не можна призначати водіям, пацієнтам, які працюють з механізмами та пристроями, що потребують підвищеної уваги та швидких психічних і рухових реакцій.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначати дорослим. Приймати всередину по 1 чайній ложці (5 мл) настойки, розведений в $\frac{1}{4}$ склянки води, за 30 хвилин до їди 3–4 рази на добу. Курс лікування – 20 днів. Через 10 днів курс лікування можна повторити. Максимальна добова доза становить 20 мл.

Діти.

Настойку не застосовувати дітям.

Передозування.

Можливе посилення побічних реакцій.

При застосуванні доз препарату, що перевищують рекомендовані, можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, блювання, порушення дихання, шлунково-кишкові розлади.

При застосуванні високих доз лікарського засобу можуть виникати симптоми отруєння, що спостерігалися після застосування плодів кінського каштану: нефротоксичні реакції, тромбоз, відчуття стурбованості; сильна діарея, що супроводжується блюванням; мідріаз, сонливість, марення, можливий летальний наслідок у результаті дихального паралічу через 24–48 годин.

Лікування: припинити застосування лікарського засобу; у разі якщо відсутнє блювання і була застосована велика кількість препарату, рекомендується промивання шлунка і застосування активованого вугілля; симптоматичне лікування.

Побічні реакції.

З боку серцево-судинної системи: біль у ділянці серця, тахікардія, артеріальна гіпотензія.

З боку шкіри: реакції підвищеної чутливості, у т. ч. висипання, почервоніння, свербіж, відчуття жару, кропив'янка, ангіоневротичний набряк.

З боку травного тракту: диспептичні явища, біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, печія, діарея.

При появі небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності.

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконах № 1, по 100 мл у банках № 1, у пачці з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

Лікарська форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от желтовато-коричневого до коричневого цвета с приятным запахом. Во время хранения возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтична група

Капилляростабилизирующие средства.

Код АТХ C05C X.

Фармакодинаміка

Венотон® - венотонизирующее, капилляропротекторные, антиэкссудативный, противовоспалительное и противоотечное средство.

Экстракт каштана конского оказывает венотонизирующее, капилляропротекторные, противоотечное, антиагрегантное и антикоагулянтное действие, что обусловлено содержанием флавоновый гликозида эскулина и сапонины эсцина. Эскулин уменьшает проницаемость капилляров, стимулирует антитромботическое активность сыворотки крови, увеличивает выработку антитромбина в ретикулоэндотелиальной системе сосудов, усиливает кровенаполнение вен, особенно при наличии патологических изменений. Эсцин снижает вязкость крови.

Основным действующим веществом софоры японской является рутин, который обладает свойством уплотнять стенки сосудов, уменьшая их ломкость. Восстанавливает эластичность сосудов, оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие.

Аминокислотный состав овса способствует выведению лишнего холестерина из организма, оказывает общеукрепляющее действие.

Плоды рябины оказывают противовоспалительное, капилляропротекторные, гипотензивное действие.

Листьев лещины оказывает противовоспалительное, сосудосуживающее действие, укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Биологическая активность травы донника определяется наличием в ней кумарина. Кумарин повышает артериальное давление, увеличивает минутный объем сердца, улучшает мозговое и периферическое кровоснабжение.

Трава чистотела оказывает противовоспалительное действие.

Показания

Заболевания вен нижних конечностей: варикозное расширение вен, венозная недостаточность (отеки нижних конечностей, судороги икроножных мышц, чувство онемения, боли и тяжести в ногах), язвы голени, флебит, тромбофлебит; геморроидальные узлы, боль и отеки при ушибах мышечных тканей и суставов; растяжение и перенапряжение связок; гематомы травматического происхождения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, внутренние кровотечения, острая и хроническая почечная недостаточность, заболевания печени в анамнезе, стенокардия, бронхиальная астма, неврологические синдромы, эпилепсия.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Препарат не следует применять одновременно с аминогликозидами, поскольку увеличивается нефротоксичность. В случае необходимости одновременного назначения с антикоагулянтами дозу последних нужно уменьшать. Не следует употреблять с антибиотиками цефалоспоринового ряда.

Особливості застосування

Лекарственное средство применять только разведенным. Во время хранения возможно выпадение осадка, однако это не влияет на эффективность препарата. Перед применением взболтать.

В случае внезапного появления необычных серьезных проявлений, особенно только на одной ноге, как отек, изменение цвета кожи, ощущение напряженности или жара, боль, больному следует немедленно обратиться к врачу, поскольку эти признаки могут быть симптомами тромбоза вен ног.

Следует обязательно применять другие неинвазивные методы лечения, такие как наложение компрессов на ноги, ношение поддерживающих эластичных чулок или обливание холодной водой. При применении лекарственного средства

следует контролировать функцию почек. Прием препаратов чистотела допустим только по назначению врача и под его наблюдением.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат нельзя назначать водителям, пациентам, которые работают с механизмами и устройствами, требующими повышенного внимания и быстрых психических и двигательных реакций.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Настойку не применять в период беременности и кормления грудью.

Спосіб застосування та дози

Препарат назначать взрослым. Принимать внутрь по 1 чайной ложке (5 мл) настойки, разведенной в $\frac{1}{4}$ стакана воды за 30 минут до еды 3-4 раза в сутки. Курс лечения - 20 дней. Через 10 дней курс лечения можно повторить. Максимальная суточная доза составляет 20 мл.

Діти

Настойку не применять детям.

Передозування

Возможно усиление побочных реакций.

При применении доз, превышающих рекомендуемые, могут возникать головная боль, головокружение, тошнота, рвота, нарушение дыхания, желудочно-кишечные расстройства.

При применении высоких доз лекарственного средства могут возникать симптомы отравления, которые наблюдались после применения плодов конского каштана: нефротоксические реакции, тромбоз, ощущение беспокойства; сильная диарея, сопровождающаяся рвотой; мидриаз, сонливость, бред, возможен летальный исход в результате дыхательного паралича через 24-48 часов.

Лечение: прекратить применение лекарственного средства в случае если отсутствует рвота и была применена большая количество препарата, рекомендуется промывание желудка и применение активированного угля симптоматическое лечение.

Побічні реакції

Со стороны сердечно-сосудистой системы: боль в области сердца, тахикардия, артериальная гипотензия.

Со стороны кожи: реакции повышенной чувствительности, в т. ч. сыпь, покраснение, зуд, ощущение жара, крапивница, ангионевротический отек.

Со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления, боль в эпигастриальной области, тошнота, рвота, изжога, диарея.

При появлении нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Термін придатності

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Умови зберігання

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

100 мл банке, в пачке из картона.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПАО «Химфармзавод» Красная звезда ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).