

## **Склад**

*діючі речовини:* 10 г гранул містять Ignatia 30CH 20 мг, Ignatia 1000CH 20 мг, Veratrum album 30CH 20 мг, Gelsemium 30CH 20 мг, Gelsemium 200CH 20 мг;

*допоміжна речовина:* крупка цукрова.

## **Лікарська форма**

Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Властивості препарату зумовлені поєднанням рослинних компонентів, що входять до його складу.

Чинить анксіолітичну та вегетостабілізуючу дію при відсутності седативного ефекту. Зменшує неспокій, відчуття тривоги, страху, напруження.

Чинить помірну антидепресивну та протисудомну дію.

Не викликає денної сонливості.

## **Показання**

У комплексному лікуванні: тривожні стани; неврози, що супроводжуються відчуттям тривоги, небезпеки, неспокою, напруги, погіршенням сну, дратівливістю; тривожно-депресивні стани та невротичні депресії на фоні соматичних захворювань; органічні ураження центральної нервової системи з підвищеною збудливістю, судомною готовністю.

## **Протипоказання**

Індивідуальна гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

При одночасному застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

### **Особливості застосування**

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини - крупки цукрової - проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не містить седативних компонентів і не спричиняє денної сонливості, тому не впливає на здатність керувати транспортними засобами та механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

### **Спосіб застосування та дози**

Дорослим і дітям віком від 3 років призначати по 5 гранул під язик 1-3 рази на добу курсами по 3-4 тижні з перервою 7 днів.

Гранули слід застосовувати під язик до повного розсмоктування, за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди. При необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води.

Дітям віком від 1 до 3 років із підвищеною судомною готовністю препарат призначати по 3 гранули, заздалегідь розчинені у невеликій кількості води, 1 раз на добу.

### **Діти**

Препарат не призначають дітям віком до 1 року.

### **Передозування**

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

### **Побічні реакції**

У поодиноких випадках можливе виникнення алергічних реакцій. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

**Термін придатності**

3 роки.

**Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 10 г у пеналі/флаконі; по 1 пеналу/флакону в пачці з картону.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).