

Склад

діюча речовина: метадоксин;

1 таблетка містить метадоксину 0,5 г;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, кремний діоксид колоїдний безводний, натрію кроскармелоза.

Лікарська форма

Таблетки.

Основні физико-химические свойства: таблетки бело- или бело-с кремуватим відтінком цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаскою и рискою; на верхние одного из боков таблетки неожиданного товарного знака пищевого поведения.

Фармакотерапевтична група

Средства, применяемые при алкогольной зависимости. Код АТХ N07B B.

Фармакодинаміка

Антиалкогольный, дезинтоксикационный, гепатопротекторный засіб. Активные ферменты печени, которые поглощают часть метаболитических соединений этанола (алкогольдегидрогеназу и ацетальдегидрогеназу), которые сприяють прискоренню процесса введенню этанола и ацетальдегиду в организм, снижают их токсичность. Поддерживает стойкость гепатоцитов к продуктам перекисного окисления липидов, индуктивного выброса различных токсических агентов, зокрема этанола. Задерживает накопление жиров в гепатоцитах, що попереджує утворення жировоев инфильтрации печени. Перешкоджає утворенню фибронектину и колагену, що гальмує процесс розвитку цирозу печени.

Активирует холин- и ГАМК-ергическую нейромедицинскую системы, внаслідок чого покращується функціонування мислення и короткой памяти. Перешкоджає виникненню рухового збудження, спричиненого етанолом. Чинить неспецифическую антидепрессивную и анксиолітичну дію, знижують тягу к алкоголю. Скорочує час купіювання абстинентного синдрому, знижують психические и соматические проявления похмального синдрому.

Фармакокінетика

Метадоксин быстро абсорбируется из травяного тракта, имеет высокую биодоступность (60-80 %). Связывание с білками плазми крови становит около 50%. Метаболизується в печах до активних метаболитов – пиридоксину и пиридоксон-карбоксилату. Период введения метадоксину при внутривенном или парентеральном введении становит 40-60 хвилин. 45-50 % метадоксину виводиться из сечею протягом 24 года, 35-50 % – из калом протягом 96 год.

Показання

- Уменьшение токсического действия алкоголя.
- Острая алкогольная интоксикация (легкой и средней тяжести).
- Алкогольный абстинентный синдром.
- Хронический алкоголизм.
- Комплексная терапия заболеваний печени, особенно алкогольной этиологии.

Протипоказання

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При сумеречном застоє метадоксин через подкисление декарбоксилювання леводопы снижает її терапевтическую эффективность.

Особливості застосування

Снижает терапевтический эффект леводопии, особенно его след с осторожностью застопорит при приеме Паркинсона на тлетерапию леводопой.

При станах тяжелой алкогольной интоксикации, що супроводжуються втратою свідомості, неприборкуванім блюванням тощо, перорально застосування лікарських засобів є недоцільним.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не влияет.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не используют.

Спосіб застосування та дози

Препарат призначають дорослим внутрішньо.

Для зменшення токсичної дії алкоголю: 2 таблетки за 30-60 хвилин до вживання алкоголю або 1 таблетка за 30-60 хвилин до вживання алкоголю та 1 таблетка протягом 30 хвилин після вживання алкоголю.

При гострій алкогольній інтоксикації легкої та середньої тяжкості, алкогольному абстинентному синдрому: по 1 таблетці 2 рази на добу за 15-30 хвилин до вживання їжі, дозу можна збільшити до 3 таблеток на добу. Курс терапії – 3-7 днів залежно від стану хворого.

При комплексній терапії хвороб печінки та хронічному алкоголізмі: по 1 таблетці 2 рази на добу за 15-30 хвилин до вживання їжі. Максимальна добова доза – 3 таблетки. Курс терапії – не менше 90 діб.

Діти.

Не слід застосовувати дітям через відсутність досвіду застосування в даній віковій групі.

Передозування

Про виски передозування метападдоксином не повідомлялось.

Побочные эффекты

Аллергические реакции.

Термин придатности

3 роки.

Умови зберігання

Сбереги в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Сбереги у недоступного для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток в блистерах; по 2 блистера в пачці.

Категория разрешения

Без рецепта.

Виробник

Товариство с додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ».

Адреса Украина, 65025

, г. Киев, ул. Одесса, 21-й км. Старокиевские дороги, 40-А.

Діти

Не следует применять детям из-за отсутствия опыта применения в данной возрастной группе.

Передозування

Про випадки передозування метадоксином не повідомлялося.

Побічні реакції

Алергічні реакції.

Термін придатності

3 года.

Умови зберігання

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Товариство з додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 65025, м. Одеса, 21-й км. Старокиївської дороги, 40-А.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).