

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 таблетка містить антитіла до мозкоспецифічного білка S-100 афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C50 – 3 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

## **Лікарська форма**

Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці нанесено риску, на іншому плоскому боці нанесено напис TENOTEN KID.

## **Фармакотерапевтична група**

Гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Препарат проявляє заспокійливу, протитривожну (анксіолітичну) дію, не викликаючи небажаної гіпногенної та міорелаксантичної дії. Покращує переносимість психоемоційних навантажень. Має стресопротекторну, ноотропну, антиамнестичну, протигіпоксичну, нейропротекторну, антиастенічну, антидепресивну дії.

В умовах інтоксикації, гіпоксії, при станах після гострого порушення мозкового кровообігу чинить нейропротекторну дію, обмежує зону ушкодження у центральній нервовій системі (ЦНС), поліпшує процеси навчання та пам'яті.

Інгібує процеси перекисного окиснення ліпідів.

Модифікує функціональну активність білка S-100, який поєднує синаптичні (інформаційні) та метаболічні процеси у мозку. Чинить ГАМК-міметичну та нейротрофічну дію, підвищує активність стреслімітуючих систем, сприяє відновленню процесів нейрональної пластичності.

## **Показання**

Невротичні та неврозоподібні розлади, що супроводжуються підвищеною збудженістю, дратівливістю, тривогою, порушенням поведінки та уваги,

вегетативними порушеннями.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 3 років.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Випадків взаємодії з іншими лікарськими засобами не виявлено.

## **Особливості застосування**

Препарат застосовують у педіатричній практиці. Застосовують дітям віком від 3 років. До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам з уродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.

У зв'язку з наявністю у препараті активуючого компонента останній прийом слід здійснювати не пізніше ніж за 2 години до сну.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат застосовують дітям.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Безпека застосування препарату вагітним та жінкам у період лактації не вивчалась.

Препарат застосовують дітям.

## **Спосіб застосування та дози**

Препарат приймають внутрішньо. Не застосовувати препарат разом з їжею.

Дозування та тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від характеру та перебігу захворювання.

Разова доза для дітей віком від 3 років – 1-2 таблетки. Таблетку тримати у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

У разі необхідності таблетку можна розчиняти у невеликій кількості (1 столова ложка) кип'яченої води кімнатної температури.

Приймати по 1 таблетці 1–3 рази на добу, протягом 1–3 місяців. У разі необхідності курс лікування можна продовжити до 6 місяців або повторити через 1–2 місяці.

У разі відсутності стійкого покращення стану протягом 3–4 тижнів від початку лікування слід звернутися до лікаря.

## **Діти**

Препарат застосовують дітям віком від 3 до 18 років.

## **Передозування**

При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, обумовлені допоміжними речовинами, що входять до складу препарату.

## **Побічні реакції**

Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.

## **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 20 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ЗАТ Сантоніка.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Вул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунаське м. сам., LT-46353, Литва.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).