

Склад

діюча речовина: вода для ін'єкцій;

1 ампула містить води для ін'єкцій 2 мл або 5 мл, або 10 мл.

Лікарська форма

Розчинник для парентерального застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна, прозора рідина.

Фармакотерапевтична група

Розчинники та засоби розведення. Код АТХ V07A B.

Фармакодинаміка

Вода для ін'єкцій апірогенна, хімічно не активна, не має фармакологічної дії.

Показання

Вода для ін'єкцій застосовується для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового, внутрішньовенного введення.

Протипоказання

Вода для ін'єкцій як розчинник лікарських і діагностичних препаратів не застосовується, якщо в інструкції для медичного застосування препарату зазначений інший розчинник.

Не застосовувати препарат для промивання очей при офтальмологічних операціях.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Вода для ін'єкцій не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії з лікарськими та діагностичними засобами, призначеними для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

Особливості застосування

Вода для ін'єкцій призначена лише для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення, у способі застосування яких передбачене застосування води для ін'єкцій.

Воду для ін'єкцій не можна безпосередньо вводити внутрішньосудинно у зв'язку з ризиком виникнення гемолізу через низький осмотичний тиск!

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосовують у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Приготування розчинів лікарських та діагностичних засобів з використанням води для ін'єкцій здійснюється в асептичних умовах (відкриття ампул, наповнення водою шприца та ємностей з лікарськими засобами). Кількість води для ін'єкцій з метою приготування розчину лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього.

Діти

Застосовують у педіатричній практиці.

Передозування

Не описано.

Побічні реакції

Не описані.

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка

По 2 мл в ампулах. По 10 ампул у пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).