

Склад

діючі речовини: 1 капсула містить 50 мг урохолуму екстракту сухого, отриманого із водно-спиртового екстракту (1 : 1) (екстрагент - етанол 40 %) із суміші: моркви дикої плодів (*Dauci carotae fructus*) - 200 мг, ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) - 180 мг, споришу трави (*Polygoni avicularis herba*) - 150 мг, кукурудзи стовпчиків з приймочками (*Zea mays styli cum stigmatis*) - 120 мг, бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) - 100 мг, хвоща трави (*Equiseti herba*) - 100 мг, хмелю шишок (*Lupuli flos*) - 50 мг, берези бруньок (*Betulae gemmae*) - 50 мг, звіробою трави (*Hyperici herba*) - 40 мг, м'яти листя (*Menthae piperitae folia*) - 10 мг; 2 % мальтодекстрину;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат;

капсула тверда желатинова: желатин, титану діоксид (E 171), заліза оксид (E 172), азорубін (E 122), індигодин (E 132), синій патентований V (E 131).

Лікарська форма

Капсули.

Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули з корпусом солом'яного кольору і темно-зеленою кришкою. Вміст капсул - порошок від світло-жовтого до коричневого кольору, що містить невеликі часточки від світлого до темного кольору. Допускається наявність агломератів часток.

Фармакотерапевтична група

Інші засоби, що застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

Фармакодинаміка

Препарат рослинного походження. Комплекс біологічно активних речовин урохолуму, легко всмоктуючись у кров та стимулюючи нирковий та печінковий кровообіг, сприяє збільшенню сечо- та жовчовиділення, нормалізує тонус гладенької мускулатури верхніх сечовивідних шляхів і жовчного міхура, послаблює запальні процеси, чинить бактерицидну, діуретичну, жовчогінну, спазмолітичну дії.

Урохолум чинить антиазотемічний ефект, виводить з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди. Сприяє виведенню піску та каменів з нирок, сечового та жовчного міхурів.

Фармакокінетика

Не вивчалась.

Показання

Застосовувати у складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань (неспецифічної інфекції) сечовивідних шляхів (цистит, уретрит) та нирок (пієлонефрит), хронічних неінфекційних захворювань нирок (нефрит, нефроз); сечокам'яної, нирковокам'яної хвороби та сольового діатезу (для профілактики утворення конкрементів, в т. ч. після їх видалення); хронічного холециститу, дискінезії жовчовивідних шляхів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Зміна реологічних властивостей крові, обтураційна жовтяниця.

Особливі заходи безпеки.

З обережністю застосовувати пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (через можливе виникнення або посилення печії).

Не застосовувати лікарський засіб, якщо діаметр каменів перевищує 3 мм.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не встановлена.

Особливості застосування

Капсула желатинова містить азорубін (Е 122), який може спричиняти алергічні реакції.

Препарат містить лактозу, тому, якщо у вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не вивчалась.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Лікарський засіб не застосовують у період вагітності та годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати перед вживанням їжі по 1 капсулі тричі на добу. Капсули слід ковтати не розжовуючи, з достатньою кількістю рідини (наприклад склянка води). Курс лікування визначається лікарем із врахуванням перебігу захворювання, характеру супутньої терапії та триває від 5 днів до 1 місяця. За призначенням лікаря курс терапії можна повторити.

Діти

Лікарський засіб не застосовують дітям віком до 12 років.

Передозування

Посилення побічних реакцій.

Лікування: при передозуванні необхідно призначити велику кількість теплового пиття та провести симптоматичне лікування.

Побічні реакції

З боку нервової системи: частота невідома - запаморочення.

З боку шлунково-кишкового тракту: частота невідома - диспептичні явища (нудота, блювання).

З боку шкіри та підшкірної тканини: частота невідома - алергічні реакції (у т. ч. висипання, свербіж, гіперемія, набряк шкіри).

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 капсул у блістері, по 6 блістерів у коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).