

Склад

діюча речовина: солодки корені (*Glycyrrhizae radices*);

1 пачка містить: солодки коренів (*Glycyrrhizae radices*) 100 г.

Лікарська форма

Корені.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки волокнистих коренів різної форми світло-жовтого, жовтого, бурувато-жовтого кольору з коричнювато-сірими, коричневими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТХ R05C A.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини коренів проявляють відхаркувальні та обволікаючі властивості, що пом'якшують кашель; чинять сечогінну, протизапальну, спазмолітичну, антигістамінну, противиразкову дію.

Показання

Захворювання дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба), запальні захворювання нирок і сечового міхура (пієліти, пієлонефрити, цистити), виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки (у складі комплексної терапії).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних компонентів препарату. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступінь ожиріння.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.

Особливості застосування

Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв., процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплом вигляді за 30 хв. до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1-2 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 12-14 років – по 1 столовій ложці 2-3 рази на добу, 5-12 років – по 1 десертній ложці 3-4 рази на добу, 3-5 років – по 1 десертній ложці 2-3 рази на добу, 1-3 роки – по 1 чайній ложці 2-3 рази на добу. Перед застосуванням відвар збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Діти

Застосування препарату рекомендується дітям віком від 1 року.

Передозування

Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.

Побічні реакції

Підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія, алергічні реакції (у тому числі висипання, свербіж, гіперемія шкіри, утворення набряків). При появі побічних реакцій препарат необхідно відмінити та звернутися до лікаря.

Термін придатності

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.