

## **Склад**

*діюча речовина:* бузини чорної квітки (*Sambuci nigrae flores*);

1 фільтр-пакет містить бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) 1,5 г.

## **Лікарська форма**

Квітки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* *цільна сировина:* окремі квітки і бутони на коротких голих квітконіжках або без них з домішкою гілочок, суцвіть і листя.

Колір жовтуватий;

*порошок крупний:* суміш подрібнених шматочків квіток і бутонів з домішкою квітконіжок, гілочок і листя різної форми. Колір жовтуватий з буруватими вкрапленнями.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТХ R05X.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять потогінну, протизапальну, знеболювальну, сечогінну та м'яку відхаркувальну дію.

## **Показання**

Грип, запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, ларингіти), нирок і сечового міхура – у складі комплексної терапії.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

1 фільтр-пакет помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл ( $\frac{1}{2}$  склянки) окропу, закрити і настоювати 15 хв. Дорослим та дітям віком від 16 років приймати у теплому вигляді по  $\frac{1}{2}$  склянки 3 рази на добу після їди. Дітям віком 3-7 років – по 2 десертні ложки 3 рази на добу після їди; 7-12 років – по 2 столові ложки 3 рази на добу після їди; 12-16 років – по  $\frac{1}{3}$  склянки 3 рази на добу після їди.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

## **Передозування**

Повідомлення відсутні.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При виникненні побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.