

## **Склад**

Carduus D1, Taraxacum D6, Chelidonium D6, Natrium sulfuricum D12, Phosphorus D12.

## **Лікарська форма**

Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі, плоскі таблетки білого кольору з можливими вкрапленнями, з розподільною рискою.

## **Властивості**

Галстена® – відновлює, захищає, очищує печінку, нормалізує роботу жовчного міхура попереджає утворення каменів

- Покращує метаболічні процеси в печінці і сприяє регенерації пошкоджень;
- попереджає і усуває розвиток запальних процесів у печінці, жовчному міхурі та жовчовивідних шляхах;
- покращує детоксикаційну функцію печінки;
- нормалізує процес желчеобразовання і жовчовиділення.

## **Фармакодинаміка**

Препарат Галстена® поєднує властивості гепатопротектора, холеретика і холекинетики, проявляє спазмолітичну і протизапальну дію на гепатобіліарну систему.

## **Фармакокінетика**

Не досліджувалась.

## **Показання**

- Гострі та хронічні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів;
- хронічний панкреатит – у комплексному лікуванні.
- лікування гострих і хронічних захворювань печінки, жовчовивідних шляхів і міхура;
- в комплексній терапії хронічного панкреатиту;
- для захисту та відновлення печінки при застосуванні антибіотиків, протизастудних, болезаспокійливих, протизапальних та інших

гепатотоксичних препаратів та алкоголю.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого з компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Клінічно значуща взаємодія препарату Галстена® з іншими лікарськими засобами не встановлена. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

## **Властивості**

Галстена® – відновлює, захищає, очищує печінку, нормалізує роботу жовчного міхура попереджає утворення каменів

- Покращує метаболічні процеси в печінці і сприяє регенерації пошкоджень;
- попереджає і усуває розвиток запальних процесів у печінці, жовчному міхурі та жовчовивідних шляхах;
- покращує детоксикаційну функцію печінки;
- нормалізує процес желчеобразовання і жовчовиділення.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не впливає або має незначний вплив.

## **Спосіб застосування та дози**

Галстена®, таблетки:

Дорослі і діти старше 12 років – по 1 таблетці 2 рази на добу;

Діти у віці від 6 до 12 років – по ½ таблетки 2 рази на добу.

На початку лікування, а також у випадках, коли потрібне швидке усунення симптомів, можливий прийом препарату до 4 разів на добу. Після поліпшення стану приймати 2 рази на добу.

Для досягнення максимального ефекту препарат Галстена®, таблетки рекомендується приймати в проміжках між прийомами їжі (за 30 хв до або через 1 год після прийому їжі).

Таблетку рекомендується тримати у роті до повного розчинення.

Якщо симптоми збільшуються або через 7 днів лікування не спостерігається поліпшення, необхідно припинити лікування і проконсультуватися з лікарем.

При хронічному перебігу захворювання курс лікування може тривати до 4 тижнів.

## **Діти**

Застосовувати препарат Галстена®, таблетки, у віці від 6 років.

У віці від 6 до 12 років застосовується за рекомендацією лікаря.

## **Передозування**

Випадки передозування не виявлені.

## **Побічні реакції**

У виняткових випадках у осіб з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів препарату можливі алергічні реакції. При появі будь-яких побічних ефектів необхідно припинити застосування лікарського засобу і проконсультуватися з лікарем.

## **Умови зберігання**

В оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С.

## **Упаковка**

По 12 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній упаковці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Ріхард Біттнер АГ.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).