

Склад

Carduus D1, Taraxacum D6, Chelidonium D6, Natrium sulfuricum D12, Phosphorus D12.

Властивості

Галстена® – відновлює, захищає, очищує печінку, нормалізує роботу жовчного міхура попереджає утворення каменів

- Покращує метаболічні процеси в печінці і сприяє регенерації пошкоджень;
- Попереджає і усуває розвиток запальних процесів у печінці, жовчному міхурі та жовчовивідних шляхах;
- Покращує детоксикаційну функцію печінки;
- Нормалізує процес желчеобразовання і жовчовиділення.

Фармакодинаміка

Препарат Галстена® поєднує властивості гепатопротектора, холеретика і холекинетики, проявляє спазмолітичну і протизапальну дію на гепатобіліарну систему.

Фармакокінетика

Не досліджувалась.

Показання

Краплі оральні:

- лікування гострих і хронічних захворювань печінки, жовчовивідних шляхів і міхура;
- в комплексній терапії хронічного панкреатиту;
- для захисту та відновлення печінки при застосуванні антибіотиків, протизастудних, болезаспокійливих, протизапальних та інших гепатотоксичних препаратів та алкоголю.

Протипоказання

Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого з компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Клінічно значуща взаємодія препарату Галстена® з іншими лікарськими засобами не встановлена. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

Властивості

Галстена® – відновлює, захищає, очищує печінку, нормалізує роботу жовчного міхура попереджає утворення каменів

- Покращує метаболічні процеси в печінці і сприяє регенерації пошкоджень;
- Попереджає і усуває розвиток запальних процесів у печінці, жовчному міхурі та жовчовивідних шляхах;
- Покращує детоксикаційну функцію печінки;
- Нормалізує процес желчеобразовання і жовчовиділення.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат не впливає або незначно впливає на здатність керувати транспортними та механічними засобами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат слід застосовувати з обережністю в період вагітності та годування груддю і тільки у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плода / дитини.

Фертильність

Дані про вплив препарату на репродуктивну функцію відсутні.

Спосіб застосування та дози

Галстена®, краплі оральні:

Дорослі і діти старше 12 років – по 10 крапель в чистому вигляді або розведеного в 1 столовій ложці води;

Діти, вік 5-12 років – по 5-7 крапель, розведених в 1 столовій ложці води;

Діти, вік 2-4 роки – по 2-4 краплі препарату, розведених в 1 столовій ложці води.

Приймати препарат 3 рази на добу.

На початку лікування, а також у випадках, що вимагають швидкого послаблення симптомів, рекомендований прийом препарату кожні ½-1 год до 8 разів на добу до покращання стану, але не більше 3 діб, після чого приймати 3 рази на добу.

Для досягнення максимального ефекту рекомендується приймати препарат Галстена®, краплі оральні, в проміжках між прийомами їжі (за 30 хв до або через 1 год після прийому їжі), потримавши препарат деякий час у роті перед проковтуванням.

При збільшенні вираженості симптомів, або в разі, якщо поліпшення не настає після 7 днів лікування, необхідно проконсультуватися з лікарем. Курс лікування в залежності від характеру і тяжкості захворювання визначає лікар.

Зазвичай тривалість курсу лікування: гепатит, гепатоз, цироз печінки – не менше 3 міс. Хронічний холецистит, жовчнокам'яна хвороба, постхолецистектомічний синдром – 2-3 міс. При необхідності курс можна повторити через 1 міс. При дискінезії жовчовивідних шляхів тривалість курсу лікування – 2-3 тижнів. Для захисту клітин печінки після антибіотикотерапії та інших шкідливих впливів – 2-4 тижні.

Діти

Застосовувати препарат Галстена®, таблетки, у віці від 6 років.

У віці від 6 до 12 років застосовується за рекомендацією лікаря.

Для лікування дітей у віці від 2 до 6 років можна застосовувати препарат Галстена® в формі крапель.

Застосування препарату Галстена®, краплі оральні, у дітей до 2 років не рекомендується через нестачу даних.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Препарат не впливає або має незначний вплив.

Передозування

Випадки передозування не виявлені.

Побічні реакції

У виняткових випадках у осіб з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів препарату можливі алергічні реакції. При появі будь-яких побічних ефектів необхідно припинити застосування лікарського засобу і проконсультуватися з

лікарем.

Умови зберігання

Краплі оральні. У щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка

По 50 мл у флаконах-крапельницях із темного скла, у картонній упаковці.

Виробник

Ріхард Біттнер АГ, Австрія

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).