

## **Склад**

*діюча речовина:* 5 мл сиропу містять алтеї кореня екстракту сухого (*Althaeae radix*) (екстрагент – вода) у перерахуванні на 20,0 % вміст полісахаридів – 7,5 мг;

*допоміжні речовини:* метилпарагідроксибензоат (Е 218) (консервант), цукор-рафінад, вода очищена.

## **Лікарська форма**

Сироп.

*Основні фізико-хімічні властивості:* сиропоподібна рідина від жовто-бурого до червоно-бурого кольору зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається наявність осаду.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.  
Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A05.

## **Фармакодинаміка**

Сироп на основі екстракту кореня алтеї є комплексним рослинним препаратом, що містить полісахариди як основну діючу речовину, а також пектини, амінокислоти, крохмаль. Препарат чинить бронхосекреторну, відхаркувальну, обволікаючу дії. Рефлекторно стимулює секрецію бронхіальних та слинних залоз. Активує утворення мокротиння, нормалізуючи його реологічні властивості (в'язкість, еластичність, адгезивність), підсилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, спричиняючи цитопротекторний і протизапальний ефекти, сприяє регенерації тканин.

## **Фармакокінетика**

Не досліджена.

## **Показання**

Кашель при гострих та хронічних захворюваннях дихальних шляхів: бронхіти, ларингіти, трахеїти, бронхіальна астма, коклюш.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад, кодеїном).

### **Особливості застосування**

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.*

У процесі зберігання допускається випадання осаду. Перед застосуванням збовтувати.

Якщо під час лікування розвивається задишка, підвищення температури або з'являється гнійне мокротиння, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Абсорбція препаратів, які застосовуються одночасно, може знижуватися. Інші препарати необхідно застосовувати за 1 годину до або через 1 годину після застосування екстракту кореня алтеї.

З обережністю застосовувати при цукровому діабеті.

Наявність у складі метилпарагідроксибензоат (Е 218) може спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Застосування препарату не впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Інформація про досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

### **Спосіб застосування та дози**

Перед застосуванням збовтувати. Препарат приймати до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 15 мл сиропу 4–6 разів на добу.

Дітям віком від 6 до 14 років препарат застосовувати по 10 мл 4–6 разів на добу; від 2 до 6 років – по 5 мл сиропу 4–6 разів на добу.

Тривалість курсу терапії визначається лікарем індивідуально, залежно від ефективності лікування і, як правило, становить 7-14 днів.

## **Діти**

Препарат можна застосовувати дітям віком від 2 років.

## **Передозування**

Випадки передозування невідомі.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції, посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування і звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі 4-8 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 200 мл у флаконі, по 1 флакону разом із мірною ложкою у пачці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ПАТ «Галичфарм».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).