

Склад

діючі речовини: 5 мл сиропу містять: адхато́ди судинної (*Adhatoda vasica*) листя екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 92,31 мг; солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) коренів екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 11,54 мг; перцю довгого (*Piper longum*) плодів екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 15,38 мг; фіалки запашної (*Viola odorata*) квіток екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 3,85 мг; ісопу лікарського (*Hyssopus officinalis*) квіток екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 7,7 мг; калгану великого (*Alpinia galanga*) кореневищ та коренів екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 7,7 мг; кордії широколистої (*Cordia latifolia*) плодів екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 15,38 мг; алтеї лікарської (*Althaea officinalis*) насіння екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 15,38 мг; зизифусу звичайного (*Zyzyphus vulgaris*) плодів екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 15,38 мг; оно́сми приквіткової (*Onosma bracteatum*) листя та квіток екстракту густого (3,25:1) (екстрагент вода) 15,38 мг;

допоміжні речовини: сахароза, лимонна кислота безводна, гліцерин, метилпарабен(Е 218), пропілпарабен (Е 216), пропіленгліколь, олія м'яти перцевої, олія гвоздична, вода очищена.

Лікарська форма

Сироп.

Основні фізико-хімічні властивості.

Однорідний сироп коричневого кольору зі смаком м'яти перцевої та специфічним запахом. Допускається утворення осаду.

Фармакотерапевтична група

Комбіновані препарати, що застосовуються при застудних захворюваннях. Код АТХ R05 X.

Фармакодинаміка

Комплексний препарат на основі лікарських трав з протизапальними, відхаркувальними, муколітичними, спазмолітичними та жарознижувальними властивостями. Покращує секреторну функцію епітелію дихальних шляхів, поверхнево-активні властивості легеневого сурфактанта, стимулює функцію ворсинок епітелію, що позитивно впливає на ексудативну та поліферативну фази запалення. Розріджує густе мокротиння та полегшує вихід слизу з дихальних шляхів. На слизові оболонки глотки та бронхів діє як місцевий антисептик.

Фармакокінетика

Дослідження показали, що застосування препарату зменшує тонус гладеньких м'язів бронхіол та трахеї, збільшує розмір бронхіол та альвеолярних мішечків, зменшує набряки слизових оболонок. Зміни вираженості кашлю спостерігаються через 3 – 4 дні прийому препарату.

Показання

Комплексна терапія запальних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів, що супроводжуються сухим подразнювальним кашлем; бронхіт (гострий та хронічний); фарингіт, трахеїт, трахеобронхіт.

Протипоказання

- Підвищена чутливість до компонентів препарату; цукровий діабет.
- Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступень ожиріння.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не рекомендується одночасне застосування препарату з протикашльовими засобами, які зменшують відходження мокротиння (таких як, кодеїн).

При необхідності застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Особливості застосування

Сироп містить цукор, на що повинні звернути увагу люди, які дотримуються низькокалорійної дієти.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

З обережністю і тільки за призначенням лікаря застосовують препарат у період вагітності та годування груддю лише у тому випадку, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати перорально.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 2 чайні ложки (10 мл) сиропу 3 – 4 рази на добу.

Дітям віком від 7 до 11 років – по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 4 рази на добу.

Дітям віком від 3 до 6 років – по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3 рази на добу.

Дітям віком від 1 до 2 років – по 1/2 чайної ложки (2,5 мл) 3 – 4 рази на добу.

Тривалість лікування – від 3 до 7 днів.

Діти

Дітям віком до 1 року препарат не призначати.

Передозування

Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може викликати порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток

гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.

Повідомлень щодо випадкового передозування не надходило.

Побічні реакції

При застосуванні препарату можливі слабкість, підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія, алергічні реакції (у тому числі висипання, гіперемія шкіри, анулярна еритема, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк); посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 90 мл або 120 мл, або 150 мл сиропу у флаконах № 1 у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед / Herbion Pakistan Private Limited.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Ділянка № 30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан / Plot № 30 Sector 28, Korangi Industrial area, Karachi, Pakistan.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).