

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 мл препарату містить олії анісової 0,0281 г, аміаку розчину 10 % 0,15 мл;

*допоміжна речовина:* етанол розведений.

1 крапля (0,02 мл) містить 70 % (0,014 мл) етанолу розведеного.

## **Лікарська форма**

Краплі оральні, розчин.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна або злегка жовтуватого кольору рідина з сильним анісовим та аміачним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.

Код АТХ R05C A10.

## **Фармакодинаміка**

Комбінований лікарський засіб з відхаркувальною дією. Анісова олія стимулює секрецію бронхіальних залоз, аміак сприяє розріджуванню мокротиння та його легкому відходженню. Крім того, анісова олія сприяє травленню і виявляє вітрогінну та антисептичну дію. Внаслідок лікування у хворих покращується травлення, нормалізується секреторна і моторна функції шлунка та кишечника, зникає метеоризм.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалась.

## **Показання**

У комплексному лікуванні захворювань органів дихання: фарингіти, трахеїти, бронхіти (гострий та хронічний), бронхопневмонії, коклюш у дітей.

## **Протипоказання**

«Нашатирно-анісові краплі» не призначати при індивідуальній непереносимості препарату.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Препарати термопсису, алтеї, інші відхаркувальні засоби посилюють терапевтичний ефект «Нашатирно-анісових крапель».

Необхідно уникати одночасного застосування інших лікарських засобів, що містять етанол.

### **Особливості застосування**

При застосуванні препарату слід утримуватися від вживання алкоголю.

Лікарський засіб містить етанол! Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

У період лікування слід утримуватись від керування автомобілем та роботи зі складними механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Лікарський засіб не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

«Нашатирно-анісові краплі» застосовувати внутрішньо. Дітям з 12 до 14 років – 10–12 крапель (розвести в 1 столовій ложці рідини). Дорослим і дітям з 14 років – 10–15 крапель (розвести в 1 столовій ложці рідини).

Приймати «Нашатирно-анісові краплі» 3–4 рази на день. Тривалість лікування визначає лікар залежно від досягнутого ефекту, переносимості лікарського засобу та характеру комплексної терапії.

«Нашатирно-анісові краплі» призначати у комплексній терапії з препаратами термопсису, алтеї та іншими відхаркувальними засобами, а також, у разі необхідності, з антибіотиками та іншими протизапальними засобами.

### **Діти**

Застосовувати дітям з 12 років.

### **Передозування**

Не виявлене.

### **Побічні реакції**

Алергічні реакції, у тому числі висипи на шкірі, свербіж, гіперемія, набряк, бронхоспазм.

### **Термін придатності**

2 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 25 мл у флаконах або у флаконах-крапельницях, у пачках або без пачок.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ТОВ «Тернофарм».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).