

Склад

діючі речовини: *Chelidonium majus* (*Chelidonium*) D3, *Silybum marianum* (*Carduus marianus*) D3, *Berberis vulgaris* (*Berberis*) D3, *Podophyllum peltatum* (*Podophyllum*) D6;

100 г препарату містять *Chelidonium majus* (*Chelidonium*) D3 – 300 мг, *Silybum marianum* (*Carduus marianus*) D3 – 300 мг, *Berberis vulgaris* (*Berberis*) D3 – 1000 мг, *Podophyllum peltatum* (*Podophyllum*) D6 – 0,3 мг;

допоміжна речовина: етанол 20 % (об/об).

Лікарська форма

Розчин оральний.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від світло-жовтого до коричнево-жовтого кольору, зі слабким запахом спирту.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний засіб.

Фармакодинаміка

Дія препарату зумовлюється сукупною дією його компонентів. Лікарський засіб сприяє усуненню хронічного та гострого запалень жовчного міхура, підшлункової залози. Регулює, нормалізує процес травлення. Завдяки дії препарату нормалізуються жовчна секреція та секреція підшлункової залози.

Фармакокінетика

Препарат швидко та майже повністю всмоктується після перорального застосування, в основному в порожнині рота і далі у шлунково-кишковому тракті. Не депонується у тканинах організму.

Показання

У комплексній терапії хронічного панкреатиту та хронічного холециститу.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів лікарського засобу, цироз печінки, гострий гепатит.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Про одночасне застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Особливості застосування

Лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (алкоголю), менше 100 мг/дозу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Лікарський засіб у рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та при роботі з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності або годування груддю перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Хронічний панкреатит

Дорослим – по 8–10 крапель на $\frac{1}{4}$ склянки води 1 раз на добу, приймати за півгодини до їди або через 1 годину після їди. При загостренні хронічного панкреатиту кількість прийомів препарату може бути збільшена до 3–5 разів на добу.

Тривалість курсу лікування – до 2 місяців.

Хронічний холецистит

Дорослим – по 8–10 крапель на $\frac{1}{4}$ склянки води 3 рази на добу, приймати за півгодини до їди або через 1 годину після їди.

Тривалість курсу лікування – до 3 місяців.

Діти

Ефективність і безпека при застосуванні препарату дітям не встановлені, тому цій категорії пацієнтів препарат не слід застосовувати.

Передозування

Малоймовірно. Симптоми передозування не описані.

Побічні реакції

Алергічні реакції, тимчасове загострення основного захворювання.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності

3 роки.

Після відкриття флакона застосувати протягом місяця.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Біолік».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).