

Склад

діючі речовини: 100 г розчину містять Chamomilla D6 10 г, Cina D6 10 г, Colocynthis D6

10 г, Lac defloratum D6 10 г, Magnesium chloratum D6 10 г;

допоміжні речовини: гліцерин 85 %, вода очищена, ксиліт.

Лікарська форма

Розчин оральний.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний в'язкий розчин.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості

Активні компоненти препарату зменшують біль у животі (у тому числі кишкові коліки) і метеоризм.

Показання

Функціональні кишкові розлади, що супроводжуються болем у животі (у тому числі кишковими коліками) і метеоризмом.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не рекомендується застосування лікарського засобу разом з їжею та напоями.

Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

Особливості застосування

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат містить невелику кількість алкоголю, менше 100 мг на дозу.

При відсутності поліпшення після 3 днів лікування або при частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат призначений для застосування дітям.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат призначений для застосування дітям.

Спосіб застосування та дози

Дітям від народження до 6 років:

- при гострих симптомах – по 3 краплі розчину щогодини, але не більше 6 разів на добу;
- після ослаблення симптоматики – по 3 краплі розчину 3 рази на добу.

Курс лікування: 3-6 днів.

Розчин слід приймати за 30 хвилин до або через 30 хвилин після їди, даючи дитині потримати його якийсь час у роті перед тим, як проковтнути.

При лікуванні дітей грудного віку розчин можна розвести у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

Діти

Препарат призначають дітям від народження до 6 років.

Передозування

Передозування не відмічалось, але можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 20 мл розчину у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/ Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/ Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).