

Склад

діюча речовина: льону насіння Semina Lini;

1 пачка містить льону насіння (Semina Lini) – 100 г або 200 г.

Лікарська форма

Насіння.

Основні фізико-хімічні властивості: насіння сплюснуте, яйцевидної форми, загострене з одного боку та закруглене з іншого, нерівнобоке, довжиною до 6 мм, товщиною до 3 мм. Поверхня насіння гладка, блискуча, зі світло-жовтим, виразно помітним насінним рубчиком (лупа 10 х). Колір насіння від світло-жовтого до темно-коричневого. Запах відсутній. Смак слизисто-маслянистий.

Фармакотерапевтична група

Засоби для лікування кислотозалежних захворювань. Код АТХ А02 Х.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять обволікаючу, протизапальну і легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного тракту та запобігаючи їх подразненню.

Фармакокінетика

Не вивчалась.

Показання

У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту (ентерити, коліти, езофагіти, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), запальних процесів шкіри (фурункульоз, абсцеси).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечника.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосовувати лише за призначенням лікаря у випадку, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15 хвилин, процідити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований препарат у теплом вигляді 3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки, віком 7-12 років – по 1 столовій ложці, віком 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння у полотняних мішечках або свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу у вигляді припарок при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування

При передозуванні можлива діарея.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції. При тривалому застосуванні – діарея та больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 г або по 200 г у пакети з вкладанням у пачку.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.