

Склад

діюча речовина: glycerol;

1 супозиторій містить гліцерину 86 % 0,75 г;

допоміжні речовини: кислота стеаринова, натрію карбонат безводний.

Лікарська форма

Супозиторії.

Основні фізико-хімічні властивості: білі або практично білі, напівпрозорі, гігроскопічні супозиторії.

Фармакотерапевтична група

Проносні засоби. Гліцерол. Код АТХ А06АХ01.

Фармакодинаміка

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30-50%), вазеліну, ланоліну. При введенні у пряму кишку супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку і рефлекторним шляхом стимулюють дефекацію. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас.

Показання

Запори різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморой в стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недіагностований біль у животі.

Особливі заходи безпеки

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосуванням супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількогодинного інтервалу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо, чи виділяється гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

Спосіб застосування та дози

Застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15–20 хв після сніданку.

Супозиторій вводять у пряму кишку і тримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.

Дорослим і дітям віком від 5 років призначають по 1 супозиторію (що містить 1,5 г гліцерину) 1 раз на добу. Дітям до 5 років – 1 супозиторій (що містить 0,75 г гліцерину) 1 раз на добу.

Діти

Немає обмежень.

Передозування

У разі передозування можливе часте випорожнення кишечника, рідкий кал. Це явище минає само собою після відміни препарату.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції; біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття в прямій кишці; іноді катаральний проктит.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 5 супозиторіїв у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Фарміна Лтд.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Вул. Ліпска, 44, 30-721 Краків, Польща.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).