

Склад

Активний інгредієнт: *Lactobacillus reuteri Protectis* (100 млн. КУО життєздатних бактерій в 5 краплях), **допоміжні речовини:** соняшникова олія, тригліцериди каприлові, агент антизкомкувач: діоксид кремнію аморфний. Без ГМО.

Не містить лактозу і білки молока.

Без консервантів.

Властивості

L. reuteri Protectis є природними мікроорганізмами, які вперше були виділені з грудного молока і в нормі присутні в організмі людини на всій протяжності шлунково-кишкового тракту.

L. reuteri Protectis колонізують епітелій і розмножуються у всіх відділах шлунково-кишкового тракту, починаючи з ротової порожнини.

L. reuteri стійкі до дії шлункового соку, солей жовчних кислот і ферментів верхнього відділу тонкого кишечника.

L. reuteri Protectis підтримують і регулюють фізіологічну рівновагу мікрофлори кишечника і активно беруть участь в процесах травлення.

L. reuteri Protectis синтезують молочну, оцтову кислоти і специфічні речовини для цього виду лактобактерій - реутерін і рейтероциклін, що пригнічують ріст патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів у травному тракті. Посилюючи природний захист травної системи від патогенних мікроорганізмів, створюють сприятливі умови для формування нормального мікробіоценозу кишечника.

L. reuteri Protectis сприяє зменшенню інтенсивності кишкових кольок і тривалості плачу під час нападів кишкової коліки у дітей грудного віку, а також частоти і тривалості нападів.

L. reuteri Protectis мають антагоністичну активність проти *H.pylori*, а також зменшують побічні реакції антибактеріальної терапії при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.

Имуностимулююча активність *L. reuteri Protectis* пов'язана з можливістю активізувати імунну систему кишечника як першу лінію захисту організму від інфекцій за рахунок збільшення кількості клітин CD4 + (специфічна підгрупа Т-

лімфоцитів).

Рекомендації щодо застосування

Застосовується для:

- відновлення мікрофлори шлунково-кишкового тракту з перших днів життя;
- профілактики нападів кишкової коліки і підвищеного газоутворення, зригування і запорів у дітей грудного та раннього віку;
- профілактики ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту після терапії антибіотиками і хіміотерапевтичними засобами;
- захисту організму від інфекцій (при зниженому імунитеті).

У комплексному лікуванні:

- алергічних станів (зокрема, при діатезі у дітей, atopічний дерматит);
- бактеріальних і мікотичних інфекцій у недоношених новонароджених;
- хелікобактерної інфекції.

Спосіб застосування та дози

Вживати дітям грудного віку (діти від народження до одного року) і раннього віку (діти у віці від одного року до трьох років) і старше по 5 крапель, розведених в чайній ложці питної води або молока, або дитячого харчування, або іншої рідини, або їжі, 1-2 рази на добу під час їжі. Курс споживання визначає лікар індивідуально. Перед застосуванням добре збовтати! Перед застосуванням і при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація лікаря.

Увага! Для розведення крапель використовувати питну воду гарантованої безпеки і якості.

Неприпустимо використання питної води з колодязів і каптажних джерел. Не додавати до гарячого!

Не змінюють смак напоїв та їжі.

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових компонентів.

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка.

Форма випуску

Краплі для перорального застосування у флаконі з темного скла з гвинтовою кришкою і індикатором першого розтину, з піпеткою і осушувачем всередині, упакованому в картонну коробку.

Термін придатності

24 місяці від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона зберігати протягом 3 місяців при температурі не вище 25 °С.