

## **Склад**

*діюча речовина:* glycerol;

1 супозиторій містить гліцерину 0,88 г;

*допоміжні речовини:* натрію карбонат декагідрат; кислота стеаринова; макрогол 400.

## **Лікарська форма**

Супозиторії.

*Основні фізико-хімічні властивості:* супозиторії напівпрозорі, майже безбарвні або зі слабким жовтуватим відтінком, з поверхнею, що маже, гігроскопічні. Допускається наявність лійкоподібної заглибини, повітряного стрижня, помутніння супозиторіїв, незначне розм'якшення поверхневого шару, наявність конденсату на упаковці.

## **Фармакотерапевтична група**

Проносні засоби. Код АТХ А06 АХ01.

## **Фармакодинаміка**

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30-50%), вазеліну, ланоліну. При введенні у пряму кишку супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку і рефлекторним шляхом стимулюють дефекацію. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас. Ефект лікарського засобу настає протягом 5-30 хвилин.

## **Фармакокінетика**

Після ректального введення всмоктування слабке, перебування в організмі короточасне. Практично не надходить до системного кровотоку та не надає системних побічних ефектів.

## **Показання**

Запори різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморой в стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недіагностований біль у животі.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Препарат може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами.

Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально.

Необхідно дотримуватись кількохгодинного інтервалу.

## **Особливості застосування**

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для вагітної перевищує потенційний ризик для плода. Невідомо, чи екскретується гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для жінки, яка годує груддю, перевищує потенційний ризик для дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

Застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15-20 хв після сніданку. Супозиторій вводять у пряму кишку і тримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з

організму разом із каловими масами. За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу. Дітям до 5 років – 1 супозиторій (що містить 0,88 г гліцерину) 1 раз на добу.

## **Діти**

Немає обмежень.

## **Передозування**

Часте рідке випорожнення. Проходить самостійно після відміни препарату.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції; біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча. При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття в прямій кишці; іноді катаральний проктит.

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи у пачці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).