

Склад

діюча речовина: кремнію діоксид колоїдний;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, целюлоза мікрокристалічна, сорбіт (E420), натрію кроскармелоза, магнію стеарат.

Показання

В якості монотерапії або в комплексній терапії:

- гострих кишкових захворювань (сальмонельоз, харчові токсикоінфекції);
- гострої діареї різної етіології;
- екзогенної інтоксикації побутовими і промисловими токсинами (алкалоїдами, солями важких металів, іншими речовинами) лікарськими препаратами, при алкогольно-харчових перевантаженнях.

Як допоміжна терапія:

- при вірусних гепатитах;
- при алергічних захворюваннях;
- при дерматитах;
- при пізній токсикоз вагітних.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість діючої речовини, а також допоміжних речовин. Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки в стадії загострення, виразки та ерозії слизової оболонки кишечника, шлункові і кишкові кровотечі, кишкова непрохідність.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному використанні Білого Вугілля® і ацетилсаліцилової кислоти можуть посилюватися процеси агрегації тромбоцитів. У комплексній терапії з нікотиною кислотою і симвастатином, Біле Вугілля® проявляє синергічну дію: сприяє зниженню рівня атерогенних фракцій ліпідного спектра крові і підвищенню рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності.

Особливості застосування

Біле Вугілля® під час його використання в комплексній терапії необхідно приймати за 1 годину до прийому інших пероральних лікарських засобів, щоб запобігти зниженню їх ефективності. Оскільки лікарський засіб Біле Вугілля® не містить цукру, його можна застосовувати пацієнтам з цукровим діабетом. Лікарський засіб містить сорбіт, тому його не слід застосовувати пацієнтам з рідкісними спадковими захворюваннями, такими як синдром непереносимості фруктози

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Рішення про прийом лікарського засобу Біле Вугілля® в період вагітності та годування груддю приймає лікар, враховуючи співвідношення користь/ризик.

Спосіб застосування та дози

Приймати в проміжках між прийомами їжі, запиваючи питною водою:

- дорослим і дітям старше 7 років - по 3-5 таблеток 3-4 рази на добу;
- дітям 5-6 років - по 3 таблетки 3 рази на добу;
- дітям у віці 3-4 років - по 2 таблетки 3 рази на добу;
- дітям до 3-х років препарат не призначають.

При крайньої необхідності у важких випадках разову дозу можна збільшити до 10-14 таблеток. При гострих кишкових захворюваннях курс лікування становить 3-5 днів. У важких випадках термін лікування може бути продовжений до 10-15 днів. Курс лікування вірусних гепатитів залежить від тяжкості захворювання і становить 10-14 днів. Тривалість лікування залежить від перебігу хвороби.

Передозування

Про випадки передозування повідомлень не було.

Побічні реакції

Випадків побічних реакцій при дотриманні способу застосування зафіксовано не було. При перевищенні рекомендованих доз можливі одиничні випадки запорів.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток в блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).