

Склад

діючі речовини: ментол, камфора, олія м'яти перцевої, олія евкаліптова, олія гвоздична, олія корична;

1 г містить ментолу 658 мг, камфори 124 мг, олії м'яти перцевої 258 мг, олії евкаліптової 65 мг, олії гвоздичної 5 мг, олії коричнеї 6 мг;

допоміжна речовина: олія мінеральна.

Лікарська форма

Бальзам для інгаляцій.

Основні фізико-хімічні властивості: білого кольору пластмасова туба з міцно накрученою кришкою. Всередині туби знаходиться фільтр циліндричної форми, просочений інгредієнтами; специфічний запах ефірних олій.

Фармакотерапевтична група

Комбіновані засоби для лікування захворювань порожнини носа. Код АТХ R01A X30.

Фармакодинаміка

Препарат належить до групи засобів, що стимулюють рецептори слизових оболонок, шкіри та підшкірних тканин. Має протизапальні, місцевозігріваючі, антисептичні, анестезуючі властивості, розширяє капіляри, покращуючи таким чином кровопостачання та незначною мірою знижуючи артеріальний тиск, діє на рефлекторні центри центральної нервової системи, проявляючи стимулюючий ефект. Дія олівця-інгалятора проявляється послабленням запального процесу та рефлекторним усуненням болю (головного, м'язового), спричиненого грипом, застудними захворюваннями та іншими чинниками.

Показання

Симптоматичне лікування застуди, нежитю, головного болю, запаморочення, нудоти.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу.
Бронхіальна астма, коклюш, псевдокруп, схильність до бронхоспазму або судом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Дослідження щодо взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами не проводилися.

Особливості застосування

Тільки для зовнішнього застосування. Уникати контакту бальзаму з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

У разі виникнення побічних реакцій з боку нервової системи (запаморочення, збудження, судом) слід утриматися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Через відсутність досвіду застосування бальзаму Зірка у період вагітності або годування груддю призначати лікарський засіб цієї категорії пацієнтів не рекомендується.

Спосіб застосування та дози

Обережно вдихати, тримаючи інгальатор біля носа. По 1-2 вдихання в кожную ніздрю 10-15 разів на добу, до зникнення симптомів.

Діти

Протипоказаний дітям до 3 років.

Препарат слід з обережністю застосовувати дітям віком від 3 років у ділянці обличчя, оскільки він може спричинити бронхоспазм.

Передозування

Можливе посилення проявів побічних реакцій, відчуття сильного тепла та печіння.

При випадковому потраплянні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання.

Лікування: промивання шлунка, симптоматична терапія.

Побічні реакції

Алергічні реакції, включаючи шкірні висипи, кропив'янку, свербіж, подразнення шкіри та слизових оболонок.

З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, збудження; можливе виникнення судом, спричинених камфорою.

З боку дихальної системи: збільшується ймовірність та частота виникнення спазму бронхів, особливо у дітей.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1,3 г в олівці; по 1 олівцю у картонній пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Данафа Фармасьютікал Джоїнт Сток Компані.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Вул. Зунг Сі Тхань Тхе, б.253, м. Дананг, В'єтнам.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).