

Склад

діюча речовина: пижма квітки.

Лікарська форма

Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: подрібнена сировина: цілісні квіткові кошики, окремі трубчасті квітки, квітколожа і їх шматочки, шматочки квітконосів; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений; порошок крупний: суміш шматочків квітколож, квітконосів, цілісних або подрібнених трубчастих квіток; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при біліарній патології. Код АТХ А05А Х.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, протимікробну, протиглисну, фітонцидну, в'яжучу та протизапальну дію.

Показання

Аскаридоз, гострики; захворювання печінки та жовчовивідних шляхів (холециститу, ангіохоліти); шлунково-кишкові захворювання (гастрити зі зниженою кислотністю, коліти, ентероколіти).

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату. Гепатити, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді за 15 хв до їди: дорослим – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу.

Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат не застосовувати дітям.

Передозування

Диспептичні розлади, блювання, в тяжких випадках – судом.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °C.

Упаковка

Подрібнена сировина: по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.