

Склад

діюча речовина: настійка плодів перцю стручкового (Fructus Capsici) (1:10)
(екстрагент – етанол 90 %);

1 флакон містить настійки плодів перцю стручкового (Fructus Capsici) (1:10)
(екстрагент – етанол 90 %) – 50 мл.

Лікарська форма

Настійка.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина жовтаво-оранжевого кольору.
Можливе випадання осаду.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому і м'язовому болю. Код АТХ
M02A B.

Фармакодинаміка

Препарат чинить місцевоподразнювальну дію і при нанесенні на шкіру діє
подібно до гірчичника.

Показання

Перцю стручкового настійку застосовувати як місцевий подразнювальний та
відволікаючий засіб при міалгіях, невралгіях, люмбаго, артритях, ревматизмі.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість до будь-якого з компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Особливості застосування

Запобігати потраплянню препарату в очі. У разі потрапляння в очі слід ретельно
промити їх великою кількістю проточної води. Не наносити препарат на місця з

гострим запальним процесом шкіри або на ушкоджену шкіру.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не досліджена.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Безпеку та клінічну ефективність настоянки у період вагітності або годування груддю не вивчали, тому в цей період препарат не слід застосовувати.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати зовнішньо. Настоянкою розтирати болючі місця 1-2 рази на добу до появи в них відчуття тепла або легкого поколювання. Для посилення дії препарату рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць.

Тривалість застосування препарату залежить від ступеня запального процесу та чутливості шкіри хворого до препарату.

Діти

Безпека та ефективність застосування препарату дітям не встановлені, тому дітям віком до 12 років препарат не слід призначити.

Передозування

Випадки передозування не спостерігалися.

Побічні реакції

Препарат зазвичай добре переноситься, але в окремих випадках при індивідуальній чутливості можлива поява алергічних реакцій: відчуття печіння, почервоніння шкіри, свербіж, висипання на місці нанесення.

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 мл у флаконі.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).