

Опис

Лікувально-профілактичний крем **Артізі** надасть незамінну і своєчасну допомогу при болях в суглобах і м'язах, при ниючих ревматичних болях і гострих міофасціальних больових синдромах.

До переліку активних інгредієнтів, крім колагену 2-го типу і збалансованого комплексу хондроїтин + глюкозамін, включений метілсульфонілметан - джерело сірки, яка необхідна організму для підтримки нормального функціонування всіх його систем.

Головною ж відмінністю **Артізі** є сім натуральних олій в складі, кожне з яких володіє окремою терапевтичною дією, а в комплексі здійснює унікальну функцію - швидку «доставку» активних інгредієнтів до місця ураження суглоба, сполучної тканини або локального м'язового болю.

Масла кропу, імбиру, гвоздики, лаванди, ментолу, евкаліпту і солодкого апельсина мають протизапальну, знеболюючу, релаксуючу і антисептичну дію, покращують мікроциркуляцію крові, сприяють регенерації клітин.

Крім зовнішнього застосування при остеопатологіях і м'язових болях, Артізі крем може застосовуватися, як базовий засіб під час процедур електрофорезу і фонофорезу для ефективного лікування суглобових і м'язових захворювань.

Призначення

Крем Артізі необхідно застосовувати при:

- захворюваннях хребта;
- в період після травма і переломів;
- при болях, набряках і запаленнях суглобового і м'язового походження;
- при підвищених навантаженнях на суглоби (надмірна вага, тривала ходьба, фізична праця);
- болю, пов'язані з суглобовою метеочутливістю.

При болях в суглобах, м'язах, біль у шиї, дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів і хрящової тканини, при гострого болю в попереку, ревматизмі, міозиті, в реабілітаційний період після травм.

Може використовуватися в комплексній терапії лікування патології суглобів.

Склад

Глюкозамін, хондроїтин, колаген 2-го типу, метілсульфонілметан, ефірні масла кропу, імбиру, гвоздики, лаванди, ментолу, евкаліпту, солодкого апельсина.

Особливості

Глюкозаміна сульфат пов'язує клітини між собою, роблячи тканини більш міцними і більш стійкими до розтягування, бере участь у формуванні та зміцненні хрящів (захисне покриття суглобових поверхонь), сухожиль, зв'язок, м'язів, шкіри, кісток, в поліпшенні якості синовіальної рідини для харчування хряща і мастила суглобових поверхонь, еластичності кровоносних судин.

Хондроїтину сульфат дає протизапальний ефект і стимулює регенерацію хрящової тканини, збільшуючи її стійкість до різних хімічних впливів і сприяє поліпшенню проникнення в уражений суглоб глюкозаміну.

Колаген 2-го типу - основний компонент сполучної тканини, необхідний для збереження цілісності хряща, зміцнення зв'язок і полегшення болю, яка виникає при пошкодженні суглобів.

Метілсульфонілметан - джерело природної сірки. Бере участь у створенні структури колагенової тканини, володіє противоокислювальним дією, сприяє захисту хрящів від пошкодження і блокує негативний вплив вільних радикалів.

Масло імбиру знімає запалення, болючість і набряки, забезпечує регенерацію сполучних тканин.

Масло кропу підсилює процеси кровотворення, завдяки наявності солей магнію і заліза, має бактерицидну і спазмолітичну дію, покращує обмін речовин і має судинорозширювальний ефект.

Масло евкаліпта знімає м'язову напругу після фізичних навантажень, є протиревматичним засобом, що усуває набряклість і біль в суглобах при артритах.

Масло лаванди застосовується для полегшення болю в суглобах і м'язах, ефективно знімає запалення.

Масло гвоздики має знеболюючу та протизапальну дію, покращує мікроциркуляцію крові в суглобах.

Масло ментолу надає відволікаючу і спазмолітичну дію, володіє місцевоанестезуючими властивостями, стимулює холодкові рецептори шкіри, завдяки чому купуються м'язові болі.

Масло солодкого апельсина має протизапальну й антисептичну дію і підсилює захисні функції організму.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість одного з компонентів препарату.

Рекомендації

Артізі крем може бути призначений в період вагітності лікуючим лікарем, у разі якщо очікувана користь для матері вище, ніж потенційні ризики для плода.

У період лактації препарат рекомендується застосовувати тільки за призначенням лікаря.

Побічних дій не виявлено.

Спосіб застосування та дози

Наноситься 2-3 рази в день на місце ураження до повного зняття больового синдрому.

Тривалість лікування залежить від характеру захворювання.