

## **Склад**

*діючі речовини:* меркуріус корозівус С6 (*hydrargyri dichloridum C6*), цистеїн С6 (*cysteinum C6*);

1 г гранул містить меркуріусу корозівусу С6 (*hydrargyri dichloridum C6*) 270 мкг, цистеїну С6 (*cysteinum C6*) 240 мкг;

*допоміжна речовина:* крупка цукрова.

## **Лікарська форма**

Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гранули однорідні за забарвленням, кулеподібної форми, білого кольору з кремуватим або сіруватим відтінком.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Препарат має протизапальні, імуномодуючі, дезінтоксикаційні властивості. Сприяє активації захисних сил організму, підвищує працездатність і загальну неспецифічну резистентність (опірність до захворювань). Нормалізує фактори протипухлинного (TNF $\alpha$ ), противірусного, протипаразитарного (sIgA) захисту. При захворюваннях на хронічний бактеріальний простатит покращує сечовипускання, зменшує біль, підвищує якість життя і сексуальні можливості.

## **Показання**

У комплексній терапії запальних процесів при захворюваннях органів дихання (ангіна, ларингіт, бронхіт, пневмонія), сечостатевої системи (пієлонефрит, простатит, аднексит), шлунково-кишкового тракту (гастрит, ентероколіт, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), ендокринної системи (тиреоїдит), опорно-рухового апарату (артрит, ревматизм, міозит, хвороба

Бехтерева), при лімфаденітах.

### **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не виявлено.

### **Особливості застосування**

Хворим на цукровий діабет слід враховувати, що препарат містить цукор.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не виявлена.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Дані щодо застосування Меркуріду у період вагітності або годування груддю відсутні.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат застосовують сублінгвально. Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування, у разі необхідності гранули можна розчинити у невеликій кількості води.

Дорослим рекомендується приймати по 7 гранул 3 рази на добу; дітям віком від 6 років – по 3 гранули 3 рази на добу.

У гострих випадках протягом перших 2 годин приймати разову дозу кожні 15 хвилин до настання покращення стану, але не більше 8 разів, після чого приймати 3 рази на добу. Приймати за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди.

Курс лікування – 3–4 тижні.

Для досягнення стійкого результату рекомендується повторення курсу лікування з інтервалом 2 тижні.

## **Діти**

Не призначати дітям віком до 6 років.

## **Передозування**

Випадків передозування не виявлено. У разі появи неприємних симптомів слід припинити приймання препарату і проконсультуватися з лікарем.

## **Побічні реакції**

У хворих з підвищеною чутливістю до будь-яких компонентів препарату можливий розвиток реакцій гіперчутливості.

## **Термін придатності**

3 роки.

*Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 10 г, по 15 г, по 20 г або по 30 г у баночках або контейнерах.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ПрАТ «Біолік».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).