

## **Склад**

*діючі речовини:* 100 г розчину містять екстракту рідкого (0,65:1) із суміші сировини: квіток ромашки (*Matricaria chamomilla* L.) - 13 г, кори дуба (*Quercus robur* L.) - 13 г, листя шавлії (*Salvia officinalis* L.) - 13 г, трави арніки (*Arnica montana* L.) - 6,5 г, кореневища аїру (*Acorus calamus* L.) - 6,5 г, трави м'яти перцевої (*Mentha piperita* L.) - 6,5 г, трави чебрецю звичайного (*Thymus vulgaris* L.) - 6,5 г; екстрагент: етанол 70% (м/м);  
*допоміжні речовини:* етанол 96 %, вода очищена.

## **Лікарська форма**

Розчин для ротової порожнини.

*Основні фізико-хімічні властивості:* непрозора рідина темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Інші препарати для місцевого застосування в стоматології. Код АТХ А01А D11.

## **Фармакодинаміка**

Лікарський засіб чинить в'яжучу, пом'якшувальну, протизапальну дію на слизову оболонку порожнини рота завдяки екстрактам кори дуба, квіток ромашки і листя шавлії. Крім того, дубильні речовини та ефірні олії, які містяться в препараті, чинять антисептичну, антибактеріальну та протигрибкову дію на слизову оболонку порожнини рота та ясен. Тести *in vitro* показали, що ефірні олії шавлії та ромашки чинять бактерицидну дію щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій, а також фунгіцидну дію щодо *Candida albicans*.

## **Показання**

Лікарський засіб призначений для застосування особам віком від 6 років як протизапальний, антибактеріальний, дезінфікуючий та в'яжучий засіб при:

- запаленнях слизової оболонки рота та горла;
- гінгівітах та стоматитах (у т.ч. при глоситах);
- поверхневих періодонтитах;
- схильності до кровотеч з ясен;
- у складі комплексної терапії при пародонтозі.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату або інших рослин родини губоцвітних (Lamiaceae), а також до селери та пилку берези (можлива перехресна реакція), підвищена чутливість до арніки, ромашки або інших рослин родини складноцвітих (Asteraceae); бронхіальна астма.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідомі.

## **Особливості застосування**

Якщо симптоматика зберігається протягом одного тижня або погіршується під час лікування препаратом, необхідно проконсультуватися з лікарем.

10 мл препарату містять до 5,67 г етанолу, що слід брати до уваги у разі застосування лікарського засобу вагітним, жінкам у період лактації, дітям.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Безпосередньо після застосування лікарського засобу алкоголь можна виявити за допомогою вимірювальних приладів у повітрі що видихується. При застосуванні відповідно до інструкції лікарський засіб не повинен впливати на здатність керувати транспортними засобами або роботу з іншими механізмами.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди.

## **Спосіб застосування та дози**

Застосовують у вигляді полоскань 3-4 рази на добу: дорослим – полоскати порожнину рота 15 % водно-спиртовим розчином препарату (7,5 мл препарату розчинити у  $\frac{1}{4}$  склянки води); дітям від 6 років застосовувати після консультації з лікарем – 10 мл препарату розчинити в 1 склянці води. Тривалість лікування 7 днів. Якщо симптоми посилюються або зберігаються, слід проконсультуватися з лікарем.

## **Діти**

До складу препарату входить спирт етиловий, тому не слід застосовувати препарат дітям віком до 6 років.

### **Передозування**

Про випадки передозування не повідомлялося.

При передозуванні можливе посилення побічних ефектів.

### **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції, включаючи, гіперемію, свербіж.

Місцево – короткочасне відчуття печіння слизової оболонки порожнини рота одразу після полоскання, а також оборотна зміна кольору зубів, яка зникає при регулярному їх чищенні.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 100 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Фітофарм Кленка С. А., Польща.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Кленка 1, 63-040, Нове М'ясто над Вартою, Польща.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру](#)

лікарських засобів України.