

Состав

діюча речовина: календули квітки (*Calendulae flores*);

1 пачка містить календули квіток (*Calendulae flores*) - 50 г;

Лекарственная форма

Цветки.

Основные физико-химические свойства:

- *Цельное сырье:* цельные или частично осыпавшиеся корзинки, без цветоносов или с остатками цветоносов. Цвет краевых цветков красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый; срединных – оранжевый, желтовато-коричневый или желтый.
- *Измельченное сырье:* смесь измельченных цветолож, цветоносов, цельных или измельченных трубчатых и ложноязычковых цветков, листочков обертки. Цвет серо-зеленый, зеленый, красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый, желтовато-коричневый, желтый.
- *Порошок крупный:* кусочки различной формы цветолож, цветоносов, листочков обертки, трубчатых и ложноязычковых цветков, цельные трубчатые цветки. Цвет серо-зеленый, зеленый, красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый, желтовато-коричневый, желтый.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические средства. Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Комплекс биологически активных веществ оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, бактерицидное, спазмолитическое и желчегонное действие, ускоряет процессы регенерации тканей, способствует заживлению язв и эрозий.

Показания

Внутрь применяют при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, энтероколитах, воспалительных заболеваниях печени, желчевыводящих путей и селезенки; наружно – при заболеваниях полости рта (молочница у детей, гингивиты, пиорея, воспалительно-дистрофическая форма пародонтоза), ангинах, тонзилитах – в составе

комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Цельная сырье: 1 столовую ложку цельных цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 3 раза в день за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки 3 -7 лет - по 1 десертной ложке. Перед применением настоев взболтать.

Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3-4 раза в сутки.

Измельченное сырье: 1 десертную ложку измельченных цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Применять в теплом виде 3 раза в день за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, дети 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки 3 -7 лет - по 1 десертной ложке. Перед применением настоев

взболтать.

Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3-4 раза в сутки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Внутри препарат применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.

Передозировка

Сообщение отсутствуют.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.