

Состав

Действующее вещество: полыни горькой трава.

Лекарственная форма

Трава.

Кусочки листьев, стеблей, корзинок разной формы серого, зеленого, желтого, зеленовато-серого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для повышения аппетита. Код АТС А15.

Биологически активные вещества препарата возбуждают аппетит, стимулируют функцию желез органов пищеварения, повышают секрецию желчи, панкреатического и желудочного соков, оказывают противовоспалительное, антисептическое действие.

Показания

Для повышения аппетита и улучшения секреторной деятельности органов пищеварения при гастритах с пониженной секреторной функцией желудка; в составе комплексной терапии холециститов, дискинезий желчных путей.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желчекаменная болезнь; наличие в анамнезе кровотечения из органов малого таза; анемия; эпилепсия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано (препарат повышает тонус матки).

Способ применения и дозы

2 чайные ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 столовой ложке 3-4 раза в сутки, детям в возрасте 10-14 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в сутки, 5-10 лет – по 1 чайной ложке 3 раза в сутки. 3 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать настой в теплом виде за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 столовой ложке 3-4 раза в сутки, детям в возрасте 10-14 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в сутки, 5-10 лет – по 1 чайной ложке 3 раза в сутки.

Курс лечения-2-3 недели. По назначению врача курс можно повторять. Между курсами обязательны перерывы до 2 месяцев.

Дети

Препарат применяют детям старше 5 лет.

Побочные реакции

Возможны реакции повышенной чувствительности (в т. ч. гиперемия, высыпания, зуд), тошнота, рвота. При появлении побочных реакций препарат отменяют.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Приготовленный настой - при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка

По 75 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО "Лектравы".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.