

Состав

действующее вещество: ортосифона тычиночного листьев (Orthosiphonis staminei folia);

1 пачка содержит ортосифона тычиночного листьев (Orthosiphonis staminei folia) 50 г.

Лекарственная форма

Листьев.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев и стеблей различной формы зеленого, серовато-зеленого, зеленовато-коричневого, фиолетово-бурого или фиолетово-коричневого цвета с вкраплениями желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Растительные средства с диуретическим эффектом. Код АТХ C03B X.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества листьев оказывают диуретическое, спазмолитическое и желчегонное действие; повышают секрецию желудочного сока, увеличивают в нем содержание свободной соляной кислоты, выводят из организма мочевину, мочевую кислоту, хлориды.

Показания

Острые и хронические заболевания почек, холециститы; отеки, вызванные нарушением функции почек или сердечной недостаточностью (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата
гиперацидный гастрит, язвенная болезнь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

1 десертную ложку листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2 раза в день за 20-30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по ½ стакана; детям 12-14 лет - по ⅓ стакана, 7-12 лет - по 1 столовой ложке, 3-7 лет - по 1 десертной ложке. При холециститах применять после еды. Перед приемом настоев взболтать.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

При передозировке возможны боли в области почек, печени, желудка.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.