

Состав

действующее вещество: крапивы листья.

Лекарственная форма

Листьев.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев различной формы. Цвет темно-зеленый, темно-серовато-зеленый, коричневатозеленый, зеленый.

Фармакотерапевтическая группа

Витамин К и другие гемостатические средства. Код АТХ В02В Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают кровоостанавливающее, диуретическое, общеукрепляющее, противовоспалительное и сосудосуживающим действием, способствуют увеличению содержания гемоглобина и количества эритроцитов, нормализуют состав крови, снижают уровень сахара в крови, способствуют регенерации слизистых оболочек пищеварительного тракта, нормализуют липидный обмен.

Показания

Легочные, кишечные, маточные, геморроидальные и другие кровотечения анемии различной этиологии, заболевания пищеварительного тракта (гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Повышенная свертываемость крови, кровотечения, вызванные кистой, полипами и другими опухолями матки и ее придатков; артериальная гипертензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано в период беременности. У женщин, которые кормят грудью, усиливает лактацию.

Способ применения и дозы

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Применять в теплом виде 2-3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 12 лет - по ½-1 стакану, детям 5-7 лет - по 2 столовые ложки, 7-12 лет - по ¼ стакана.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 5 лет.

Передозировка

Сообщение отсутствуют.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). Тошнота, рвота, диарея, боль в области желудка. В случае возникновения побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 1,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетах в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.